

اخْتِبَارُ الْمُلْكَ الْأَوَّلِ فِي مَاذَا الرِّبَاضِيَّاتِ

المدة: ساعتان

المستوى: ثانوية علوم تجريبية

التمرين الأول: (05 نقاط)

أجب بـ صحيح أو خاطئ مع التّعليل .

$$\text{و } g \text{ دالٰتین معرفتٰن علی } \mathbb{R} \text{ ب: } g \circ f(x) = -x + 1, f(x) = 2x^2 + 1. \text{ دالٰت } f \text{ معرفتٰ ب: } (g \circ f)(x) = -2x^2 + 2$$

.) منحنى الدالة $f(x) = \frac{1}{x+1} - 2$ هو صورة منحنى الدالة مقلوب بالإنسحاب الذي شعاعه $v \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3) معادلة المماس لمنحنى الدالة $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$ عند النقطة ذات الفاصلة 0 هي: $y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$

إذا كان مماس منحنى دالة f عند النقطة ذات الفاصلة (-3) موازيًّا لل المستقيم ذو المعادلة $y = 2x$ فإن: $f'(-3) = 0$

$$5) \text{ حلول المعادلة } x^4 - 5x^2 + 4 = 0 \text{ هي: } -2; -1; -3; 2$$

التمرين (70 فقاً) الثاًنِي:

يحتوي صندوق على 7 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس . منها كريتان تحملان الرقم 2 ، كريتان تحملان الرقم 0 و ثلاثة كريات تحملان الرقم 1 .

رسنخ على التوالي كريتتين بدون إرجاع.

1) عِيْن مَجْمُوعَة الْمَكَانِيَّاتِ.

2) نعتبر الحديثين : *A* "الكريستان المسحوبتان تحملان نفس الرقم" .

"الكريتان المسحوبتان تحمل كل منهما رقمًا زوجياً".

أ) عيّن كل من الحدث $A \cap B$ ، B ، A

ب) أحسب كل من: $P(A \cap B)$, $P(\bar{A})$, $P(B)$, $P(A)$ واستنتج

3) ليكن المتغير العشوائي X الذي يرافق بكل سحب جداء الأرقام المسجلة على الكريات المسحوبة. عين قيم X .

✓ عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X . وأحسب أمله الرياضي.

✓ ✓ ✓ أحسب كل من التباين والانحراف المعياري .

التمرين الثالث: (08 فقاها)

ليكن α و β عددين حقيقيين ولتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ: $f(x) = \frac{\alpha x^2 + \beta}{2 - x}$. تمثيلها البياني في معلم متعمد ومتجانس C_f .

1) عين العددين α و β بحيث يقبل C_f عند النقطة $A(1; -2)$ مماساً افقياً.

$$\beta = -3, \alpha = 1 \text{ نضع} \bullet$$

2) أدرس إتجاه تغير الدالة f . ثم شكل جدول تغيراتها.

3) بين أنه توجد نقطتان يقبل فيهما المنحنى C_f مماساً معامل توجيهه 2.

(3) أكتب معادلة المماس للمنحنى C_f عند النقطة ذات الفاصلة 3.

(4) برهن أن: $f(4-x) + f(x) = -8$. مادا تستنتج ؟

(5) عين نقط تقاطع المنحنى C_f مع المحاور.

(6) نتken g دالة معرفة وقابلة للإشتقاق على $\mathbb{R} - 2$ حيث :

- إذا كان $g(3) = 2$ عين القيمة المقربة لـ $g(3,0001)$:

(7) نتken h دالة معرفة على $\mathbb{R} - 2$ بـ :

- بين كيف يمكن رسم C_h إنطلاقاً من C_f .

- شكل جدول تغيرات الدالة h .

الاستاذ ناجي