


## الاختبار الثاني في العلوم الفيزيائية

المدة 2 ساعة

المستوى: السنوات الثانية تر + ١

### التمرين الأول:

تكون الجملة المماثلة بالشكل المقابل من :



\* بكرة متجانسة نصف قطرها  $r = 10\text{cm}$  قابلة للدوران حول محور افقي ( $\Delta$ )

يمر بمركزها  $O$  ، وعزم عطالتها بالنسبة لمحورها هو  $J_\Delta = 5 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ .

\* خيط ( $f$ ) غير قابل للامتياط وكتلته مهملة، ملفوف حول البكرة ويحمل في

طرفه جسم (S) كتلته  $M = 2\text{kg}$

نهم جميع الاحتكاكات ونأخذ :  $g = 10\text{N} / \text{kg}$

1- نطبق على البكرة، بواسطة الخيط ( $f$ ) ، قوة  $\vec{F}$  أفقية وثابتة ،

فينطلق الجسم (S) عند اللحظة  $t = 0$  بدون سرعة ابتدائية من النقطة  $A$

ذات الترتيب  $z_A = 0$  ليصل إلى النقطة  $B$  ذات الترتيب  $z_B = 5\text{m}$

عند اللحظة  $t_B$  بالسرعة  $v_B = 4\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

أ- أوجد عمل ثقل الجسم (S) خلال الانتقال  $AB$ . ما طبيعته ؟

ب- بدراسة الحصيلة الطاقوية للجسم (S) بين اللحظتين  $t = 0$  و  $t_B$  ، أوجد شدة القوة  $\vec{T}$  التي يطبقها الخيط

( $f$ ) على الجسم (S).

2- بتطبيق مبدأ انفاذ الطاقة على البكرة بين اللحظتين  $t = 0$  و  $t_B$  ، احسب شدة القوة  $\vec{F}$ .

### التمرين الثاني:

نواس بسيط يتكون من كرة معدنية كتلتها  $m_1 = 500\text{g}$  نعتبرها نقطية، وخيط طوله  $l = 1\text{m}$ .

نزيح النواس عن وضع توازنه الشاقولي بزاوية  $\theta$  ، ثم نتركه حررا لحاله من الوضع  $A$  ، فيصطدم أثناء مروره بوضع

توازنه الشاقولي  $B$  بعربة ساكنة كتلتها  $m_2 = \frac{m_1}{2}$  اصطداما مرنا (يتم خلاله تحويل كل الطاقة التي تمتلكها الكرة

إلى العربة ( $m_2$ ) لتوقف ( $m_1$ ) و تواصل ( $m_2$ ) حركتها دون احتكاك على المستوى الأفقي  $BD$ .

تصطدم العربة عند وصولها الموضع  $C$  بطرف نابض من مثبت أفقيا من نهايته الأخرى ، ثابت مرونته

$K = 50\text{N} / \text{m}$  لتوقف العربة عند الموضع  $D$  و ينضغط النابض عند مقدار  $x = 10\text{cm}$ .

1- مثل الحصيلة الطاقوية لجملة تختارها ، بين الموضعين  $B$  و  $D$  مستنرجا سرعة العربة عند الموضع  $B$


و لتكن  $v_{2B}$

2- بين أن سرعة الكرة عند الموضع  $B$  و لتكن  $v_{1B}$  تحقق العلاقة:  $v_{2B} = v_{1B} \sqrt{2}$ . احسب  $v_{1B}$ .

3- أ- أكتب معادلة إنفاذ الطاقة للكرة بين الموضعين  $A$  و  $B$ .

ب- بين أن عبارة سرعة الكرة عند  $B$  هي:  $v_{1B} = \sqrt{2gl(1-\cos\theta)}$

ج- استنتج مقدار الزاوية  $\theta$ .



### التمرين الثالث:

حضر محلولاً لكlor الصوديوم  $(Na^+ + Cl^-)_{(aq)}$  تركيزه المولى:  $C_0 = 25 \cdot 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$  ، وذلك بإذابة كتلة  $m$

من كلور الصوديوم الصلب  $NaCl$  في  $50ml$  من الماء المقطر، نضع محلول المحصل عليه في دورق و نقىس ناقليته النوعية  $\sigma$  باستعمال جهاز قياس الناقليه (*Conductimetre*) . نضيف للمحلول المحصل عليه  $50ml$  أخرى من الماء المقطر و نقىس ناقليته الجديدة، نعيد التجربة عدة مرات بإضافة نفس الكمية من الماء كل مرة، فنحصل على جدول القياسات التالي، حيث  $V$  يمثل حجم محلول المخفف بعد إضافة الماء.

$V (ml)$	50	100	150	200	250	300
$\sigma (mS \cdot m^{-1})$	280	144	98	74	60	50
$C (mol \cdot L^{-1}) \cdot 10^{-3}$	25					

1- أكمل الجدول أعلاه مع التعليل.

2- أرسم المنحنى البياني الممثل العلاقة ( $C = f(\sigma)$  ، باستعمال سلم رسم مناسب ثم علق عليه.

3- إذا كانت الناقليه النوعية لمحلول كلور الصوديوم عند نقطة معينة هي  $\sigma = 250 mS \cdot m^{-1}$  . فكم يكون تركيزه  $C$  ؟

4- احسب الناقليه النوعية لمحلول كلور الصوديوم تركيزه  $5 \cdot 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$  وقارن هذه النتيجة مع النتيجة المحصل عليها بواسطة التجربة، علما أنه عند الدرجة  $25^\circ C$  تكون:

$$\lambda_{Na^+} = 5,01 \cdot 10^{-3} S \cdot m^2 \cdot mol^{-1} \quad \lambda_{Cl^-} = 7,63 \cdot 10^{-3} S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$$

5- استنتاج قيمة كتلة كلور الصوديوم  $m$  المستعملة في تحضير محلول الابتدائي، علما أن درجة نقاوة ملح كلور الصوديوم  $NaCl$  الصلب هي:  $p = 90\%$

يعطى:  $CI = 35.5 g/mol$  و  $Na = 23 g/mol$