

- الموضوع

طرق الفصل - مختلف وحدات التركيز  
• التحليل الحجمي (المعايير).

الأستاذ: بوطالب إ

## الاختبار الأول في مادة هندسة الطرائق

المستوى: 2 تقني رياضي (هـ)

مدة الإنجاز: ② ساعات و نصف

مديرية التربية لولاية عين الدفلة

ثانوية فتحة احمد العبادية

تاريخ الإنجاز: 2019-12-03

### توجيهات عامة

يجب إعطاء العلاقات الحرفية قبل إنجاز التطبيقات العددية.

كل نتيجة غير متبوعة بوحدتها الملائمة تعتبر خاطئة.

يمكنك إنجاز تمارين الامتحان حسب الترتيب الذي يناسبك.

يؤخذ بعين الاعتبار تنظيم ورقة الإجابة.


06 نقاط

التمرين الأول: فصل الأوكاليبتوول eucalyptol 'ا عن الماء

سلم  
التنقية

شجرة eucalyptus تنمو ب مختلف مناطق العالم ، تحتوى أوراقها على زيت أساسى عطري يدعى : الأوكاليبتوول eucalyptol 'ا الذي يستعمل في تحضير بعض الأدوية الخاصة بتخفيف السعال خاصة بفصل الشتاء و بغرض الحصول على الزيت الأساسى لأوراق هذه الشجر نتبع الخطوات التالية :

نأخذ كمية من أوراق شجرة eucalyptus 'ا و نقوم بوضعها داخل دورق كروي يحتوى على 200 ml من الماء نركب المكثف المائي ثم نسخن المزيج لمدة 30 دقيقة ، نوقف التسخين ثم نرشح المزيج المتحصل عليه ، لنتحصل على مزيج متجانس من الماء و الزيت الأساسى eucalyptol 'ا .



الوثيقة 1


إليك الشكل التالي و المستعمل في عملية التسخين :

أ- أكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 6

ب- ما دور الأداة رقم 1 و هل يمكننا الاستغناء عنه ؟

للحصول على الأوكاليبتوول نستعمل طريقة الاستخلاص المتقطع بواسطة مذيب مناسب من الجدول التالي :

المذيب	الامتزاج مع الماء	انحلالية الأوكاليبتوول	الكثافة عند 20°C
الطلولين	لا يمتزج	ضعيفة	0.87
الإيثانول	يمتزج	جيدة	0.81
الكلوروفورم	لا	متوسطة	1.46
حلقى الهاكسان	لا يمتزج	جيدة	0.78



الوثيقة 1

أ- ما هو المذيب المناسب لعملية الاستخلاص ؟ مع التعليل

ب- أكمل البيانات المرقمة للشكل المقابل ؟

01.00  
1,00  
0.50

مع التعليل في 2 و 3

ج- أشرح عملية الاستخلاص المنجزة باختصار ؟

د- أحسب حجم كتلة m=8.7 g من الطلولين.

01.00

1,00

0.50

1,00

0.50

تتوفر بمخبر الكيمياء قارورة لحمض الأزوت القوي  $\text{HNO}_3$  تحتوي على المعلومات التالية:

$$(H^+ + NO_3^-) : (P = 60\%, d = 1.38, M = 63 \text{ g/mol})$$

① نأخذ حجم قدره  $V = 2.28 \text{ mL}$  من حمض الأزوت التجاري لتحضير محلول  $S_0$  من حمض الأزوت حجمه  $300 \text{ mL}$ .

أ- أحسب نظامية محلول المحضر  $S_0$ . 0.75

✓ نمدد محلول  $S_0$  2 مرتين للحصول على محلول  $S_1$ .

ب- أحسب التركيز المولى للمحلول  $S_1$ . 0.75

② نقوم بمعايرة حجم  $V = 20 \text{ mL}$  من محلول النشادر  $\text{NH}_3$  بواسطة محلول  $S_1$  المحضر سابقاً و ذلك بإضافة كاشف ملون مناسب فكان الحجم اللازم لبلوغ نقطة التكافؤ  $V(\text{HNO}_3) = 10 \text{ mL}$ .

أ- ما نوع المعايرة و ما الهدف منها؟ 0.5

ب- وضح البروتوكول التجاري لعملية المعايرة عليه كافة البيانات. 01.00

ج- اذكر الكاشف المناسب المستعمل بعملية المعايرة محدداً لونه قبل و بعد نقطة التكافؤ. 0.75

د- أكتب معادلة التفاعل الحاصل عند المعايرة. 01.00

ه- أحسب النظامية و التركيز المولى لمحلول  $\text{NH}_3$ . 0.75

و- أحسب كمية المادة لمحلول النشادر  $\text{NH}_3$  المعاير. 0.5

③ أحسب الإرتياط المطلق على نظامية و التركيز المولى لمحلول  $\text{NH}_3$  و اعط الكتابة الصحيحة لهما

$$\Delta N_{\text{HNO}_3} = 0.001 \text{ mol/L} . \Delta V_{\text{Burette}} = 0.02 \text{ cm}^3 . \Delta V_{\text{pipette}} = 0.04 \text{ cm}^3$$

### التمرين الثالث: 07 نقاط

من أجل تحديد نظامية محلول كبريتات الحديد الثنائي  $\text{FeSO}_4$  (C1) نضع في بيسير  $V_1 = 30 \text{ mL}$  منه

نقوم بمعايرته بمحلول بيكرومات البوتاسيوم  $(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = C_2 = 0.2 \text{ mol/L}$  نضيف قطرات من حمض الكبريت  $\text{H}_2\text{SO}_4$  و نسخح الحجم تدريجياً فكان الحجم اللازم لبداية تغير اللون (نقطة التكافؤ)  $V_2(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 15 \text{ mL}$ .

① أعط مفهوماً للأكسدة والإرجاع. 1.00

② أكتب المعادلة النصفية لتفاعل الأكسدة والإرجاع ثم استنتج معادلة الأكسدة الإرجاعية الحادثة؟ 2.00

③ أوجد علاقة تركيز  $\text{C}_1$  بدلالة تركيز  $(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = C_2$  و  $V_2$  و  $V_1$ . 1.00

④ استنتاج عندئذ التركيز المولى  $(\text{FeSO}_4)$  و تركيزه الكتلي. 1.00

⑤ استنتاج التركيز المولى للشوارد الموجودة بمحلول  $(\text{FeSO}_4)$ . 1.00

⑥ أحسب نظامية محلول كبريتات الحديد الثنائي  $(\text{FeSO}_4)$ . 0.50

⑦ أحسب كتلة كبريتات الحديد الثنائي اللازم إذابتها في  $1 \text{ L}$  للحصول على التركيز  $C_1$

يعطي: 

$$(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}), (\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+})$$

$$Fe = 56 \text{ g/mol} ; S = 32 \text{ g/mol} ; O = 16 \text{ g/mol}$$

- أستاذ هندسة الطرائق -  
بوطالب إسعايريل

بالتوفيق للجميع