


اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية

التمرين الأول : (8 نقاط)

نترك كرة فولاذية كتلتها $m = 800g$ تسقط سقطاً حراً (أي تحت تأثير ثقلها) دون سرعة ابتدائية من الموضع (A) الذي يقع على ارتفاع $1m$ من الموضع (B) ، الذي يمثل بداية مستوى خشن مائل عن الأفق بزاوية $\alpha = 30^\circ$ ، بعد قطعها مسافة $BC = 1m$ على هذا المستوى ، تصلد الكرة الفولاذية مساراً دائرياً أملساً نصف قطره (R)



1- مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (كرة) بين الموضعين (A) و (B) .

2- اكتب معادلة انفاذ طاقة الجملة بين الموضعين (A) و (B) ، ثم احسب سرعة الكرة عند الموضع (B) .

3- تصل الكرة إلى الموضع (C) بسرعة $V_C = 5m/s$:

أ / مثل القوى المطبقة على الكرة أثناء حركتها وفق المستوى المائل BC .

ب / مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (كرة + أرض) أثناء الانتقال من (B) إلى (C) .

ت / باستعمال مبدأ انفاذ الطاقة احسب شدة قوة الاحتكاك f .


ث / ما هي شدة قوة الاحتكاك f حتى تكون حركة الكرة مستقيمة منتظمة وفق الجزء BC .

4- اكتب معادلة انفاذ طاقة الجملة (كرة + أرض) بين الموضعين (C) و (D) .

5- أوجد نصف قطر المسار الدائري R ، علماً أن الكرة تصل إلى الموضع (D) بسرعة $V_D = 4,14m/s$.

التمرين الثاني : (12 نقطة)

نثبت على طاولة أفقية ، في نقطة (O) نابضاً مرناً حلقاته غير متلاصقة ، ثابت مرونته K و نضغط نهايته الأخرى من الموضع (B) إلى الموضع (A) فيكون مقدار التشوه (الانضغاط) $AB = x_0 = 10cm$ ، نضع أمام النهاية المضغوطة جسماً كتلته $m = 0,1kg$ ، ثم نحرر النهاية المضغوطة فينطلق الجسم من النقطة (A) إلى (B) ليكمل حركته على سطح الطاولة إلى النقطة (C) أين يتوقف و تتعدم سرعته .



الجزء الأول :

1 - باعتبار الجملة (جسم + نابض) ، مثل الحصيلة الطاقوية لهذه الجملة بين النقطتين (A) و (B) .

2 - اعتماداً على انفاذ الطاقة ، أوجد عبارة v_B^2 بدلالة m كتلة الجسم ، x_0 مقدار التشوه و K ثابت مرونة النابض .

3 - قمنا بتصوير حركة الجسم على الطاولة ، ثم عالجنا الفيديو ببرمجة خاصة ، دراسة حركة الجسم في الجزء الخشن BC من الطاولة مكتننا من الحصول على البيان الممثل في الشكل 1 - حيث d المسافة المقطوعة من طرف الجسم و v سرعته في الموضع المزبورق .

أ / اكتب معادلة انفاذ طاقة الجسم بين الموضعين (B) و موضع كيفي من الجزء BC .

$$b / \text{اثبت أن : } v^2 = v_B^2 - \frac{2f}{m} \cdot d$$

حيث v هي سرعة الجسم في موضع كيفي و d المسافة المقطوعة عند بلوغه هذا الموضع .

ت / اكتب معادلة البيان الممثل في الشكل 1 - .

ث / اعتماداً على السؤالين (3 - ب) و (3 - ت) أجد ما يلي :

1 - v_B سرعة الجسم عند الموضع (B) .

2 - K ثابت مرونة النابض .

3 - f شدة قوة الاحتكاك .


ج / استنتج المسافة BC

4 - في رأيك كيف يكون شكل البيان في حالة الجزء BC أملس ؟ مثله على ورقة الإجابة مع التعليق .

الجزء الثاني :

1 - نعيد نفس التجربة السابقة لكن الحركة تكون شاقولية نحو الأعلى جد أقصى ارتفاع h يمكن للجسم أن يبلغه .

المعطيات : $g = 10N/Kg$



فسيق و اسد

(O)