

الاختبار الأول في مادة الفيزياء

التمرين الأول : (04 نقاط "ر" ، 6 نقاط "ع")

بعد دراسة موضوع السقوط الشاقولي لجسم صلب في الهواء أرادت فايزه و صباح تطبيق ما درستاه .

- تركت فايزه من شرفة منزلها جسما صلبا كتلته $m = 10\text{ g}$ يسقط بدون سرعة ابتدائية من نقطة O تعلو بـ h عن سطح الأرض وهو يملك مواصفات تسمح له بالسقوط وفق نظامين يخضع الجسم خلالهما إلى قوة احتكاك عبارتها : $\vec{f} = -K\vec{v}$



1 - مثل القوى الخارجية المؤثرة على الجسم خلال كل نظام

2 - ذكر نص القانون الثاني لنيوتون.

3 - بتطبيق القانون الثاني لنيوتون على الجسم أوجد المعادلة التفاضلية للسرعة .


3-1 - استنتج : أ - عباره السرعة الحدية v_{\lim} بدلالة P, Π, K :

ب - عباره التسارع الابتدائي a_0 بدلالة P, Π, m :

4 - بين أنه من أجل : $\frac{P}{\Pi} = n$ حيث $n > 1$ تكون عباره $a_0 = \frac{n-1}{n}g_0$ حيث :

ما هي قيمة n التي من أجلها قبل أن دافعة أرخميدس مهملة حيث : $a_0 = 0,98g_0$:

4 - قامت صباح بتسجيل شريط فيديو لحركة الجسم و باستعمال برنامج *Avistep* تحصل على البيان التالي :



4-2 - بالاعتماد على البيان أوجد : - السرعة الحدية v_{\lim} و قيمة التسارع الابتدائي a_0 في اللحظة $t = 0$

يعطى : $g_0 = 9,8\text{ m/s}^2$

4-3 - هل يمكن اعتبار دافعة أرخميدس مهملة ؟ ببر إجابتك


4-4 - جد بالتحليل البعدي وحدة معامل الاحتكاك K ثم أحسب قيمته .

4-5 - ما هي قيمة ثابت الزمن τ ؟ . و هل تتغير قيمته إذا تركنا الجسم من علو ضعف العلو السابق ؟ على

5 - باعتبار قوى الاحتكاك مهملة كيف يكون سقوط الجسم ؟ أرسم كييفيا عندئذ كلًا من منحنى السرعة و التسارع

بدلالة الزمن في نفس المعلم .

القمر (L) هو القمر الطبيعي الوحيد للأرض بالإضافة إلى أنه خامس أكبر قمر طبيعي في المجموعة الشمسية و هو يُعد الأكبر في المجموعة الشمسية من ناحية نسبة حجمه إلى كوكبه التابع له و يعد كذلك متزامن الدوران فهو يدور حول محوره مرة واحدة خلال نفس المدة التي يُكمل فيها دورة واحدة T_L حول الأرض. و يتسبب هذا بأن القمر يُعطي دائمًا للأرض نفس الوجه تقريبًا و تتغير المسافة بين الأرض والقمر تقريبًا من 356550 كم عند الحضيض إلى 406850 كم عند الأوج. يهدف التمرين إلى دراسة بعض خصائص القمر التابع للأرض و مقارنته ببعض الأقمار الاصطناعية .





معطيات فلكية	
$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ SI}$	ثابت الجذب العام
$M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{ Kg}$	كتلة الأرض
$R_T = 6400 \text{ Km}$	نصف قطر الأرض
$m_L = 7,35 \cdot 10^{22} \text{ Kg}$	كتلة القمر
$T_{(T)} = 24 \text{ h}$	دور الأرض حول محورها

- 1 - في أي مرجع تتم دراسة حركة القمر (L) ثم عرف المعلم المرتبط به .
- 2 - لدراسة القمر (L) نعتبر أنه يدور حول الأرض في مسار دائري نصف قطره r_L .
- 3 - بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على القمر (L) على القمر (T) بدلالة : G , M_T , m_L , r_L .
- 4 - ينجز القمر الاصطناعي (S) الجزائري ألكوم سات - 1 - دورة واحدة حول الأرض في مسار دائري نصف قطره r_s خلال دورة واحدة للأرض حول محورها .
- 5 - بـ خاص رياضيات + تر - أحسب السرعة الزاوية ω_L لدوران القمر (L) حول الأرض . تذكير : $\omega = \frac{2\pi}{T} (\text{rad/s})$
- 6 - بـ خاص رياضيات + تر - أحسب السرعة الزاوية ω_L لدوران القمر (L) حول الأرض . تذكير : $\omega = \frac{2\pi}{T} (\text{rad/s})$

التمرين الثالث : 5 نقاط "ر" خاص (رياضيات + تقيي رياضي)

في لعبة كرة السلة فإن القيام بأية محاولة من شأنها إعاقة المنافس عن طريق الاحتكاك البدني يعد أمراً غير قانوني ويحصل اللاعب الذي يتم ارتكاب خطأ ضده على الكرة ليقوم بتمريرها مرة أخرى داخل الملعب أو يحصل على رمية حرة و اعتماداً على ما إذا كانت التسديدة ناجحة من عدمها تُمنح نقطة واحدة فقط في حال إحراز الرمية الحرة، والتي يتم تسديدها من على خط يبعد بـ d عن الشاقلون المار من مركز السلة



دراسة رمية حرة

يُقذف لاعب الكرة (S). بسرعة إبتدائية \bar{v}_0 يصنع حاملها زاوية α_0 مع الخط الأفقي المار بنقطة القذف نحو مركز سلة N تعلو بـ H و تقع على بعد d من شاقلون نقطة القذف و التي ترتفع بـ h عن سطح أرضية الملعب .

- أدرس طبيعة حركة الكرة (S) في معلم الدراسة (Ox, Oy) و اعط المعادلتان الزمنيتان للحركة $y(t)$ ، $x(t)$.
- استنتج معادلة المسار .

3 - ما هي إحداثيات مركز السلة N ؟

- يُقذف اللاعب الكرة بسرعة إبتدائية $v_0 = 8 \text{ m/s}$ يصنع حاملها زاوية $\alpha_0 = 45^\circ$ مع المستوى الأفقي .
- هل رمية اللاعب ناجحة ؟ علل إجابتك

- تسجيل شريط فيديو لرمية ناجحة و معالجته ببرنامج *Avistep* مكتننا من رسم المنحى البياني الممثل في الشكل -1- و الذي يمثل تطور $\tan(\alpha)$ بدلالة الزمن.

- يبين أن معادلة تطور $\tan(\alpha)$ بدلالة الزمن يعطى بالعلاقة :
- استنتاج خصائص شعاع السرعة الابتدائية \bar{v}_0 (شدة v_0 و اتجاه α_0) لهذه الرمية.
- استنتاج بيانيا قيمة الزاوية α_N التي يصنعها شعاع السرعة \bar{v}_N مع المستوى الأفقي .
- بتطبيق مبدأ إنفاذ الطاقة على جملة (الكرة) أحسب سرعتها لحظة دخولها للسلة .


التمرين التجاري: 7 نقاط "ر + ع"



عندما يلتصق ورق الألمنيوم بالطعام خاصة ذلك الذي يحتوي على حمضيات كعصير الليمون او البرتقال فعنصر الألمنيوم Al^{3+} يختلط بالأكل و قد يؤدي إلى الإصابة بألم في العضلات و يؤثر على خلايا المخ و يسبب مرض الزهايم.

من أجل ذلك ينصح العديد من الأطباء بعدم إستعمال ورق الألمنيوم في الطبخ و تغليف الأطعمة خاصة إذا كانت ساخنة و تحتوي على حمض (خل ، طماطم ، ليمون ،)
يهدف التمرين لدراسة تفاعل معدن الألمنيوم مع الحمض .

نضع قطعة من ورق الألمنيوم Al كتلتها m_0 في دورق كروي سعته 500 ml و نضيف له حجم $V_S = 200\text{ mL}$ من محلول حمض كلور الماء تركيزه المولى C مغلق بإحكام و موصول بجهاز قياس ضغط تقاضي لقياس ضغط $H_{2(g)}$ الناتج عن التحول بدلالة الزمن عند درجة حرارة ثابتة خلال تطور الجملة و الذي مكنا من رسم البيان المبين في الشكل - 3 - .



1 - الثنائيان (مر/مؤ) الداخلتان في التفاعل هما (Al^{3+} / Al) ; (H_3O^+ / H_2)
بيين أن معادلة التفاعل الحادث تتمذج بالمعادلة التالية :

$2Al_{(s)} + 6H_3O^+_{(aq)} = 2Al^{3+}_{(aq)} + 3H_{2(g)} + 6H_2O_{(l)}$
2 - نعتبر ثنائي الهيدروجين $H_{2(g)}$ غاز مثالي ينطبق عليه القانون :

$P_{H_2} V_{H_2} = n_{H_2} \cdot RT$
- بالاستعانة بجدول التقدم . بين أن تقدم التفاعل يعطي بالعلاقة التالية .

ملاحظات التجربة : عند اللحظة $t_f = 12\text{ min}$ نلاحظ ما يلي

أ - توقف انطلاق الغاز عند نقاط التلامس بين ورقة الألمنيوم و محلول حمض كلور الهيدروجين .

ب - قطعة متبقية من ورقة الألمنيوم و عند إخراجها و تجفيفها و جدنا أن كتلتها $m_f = 0,54\text{ g}$.

ج - إستقرار مؤشر مقياس الضغط التقاضي على القيمة : $P_{H_2} = 997200\text{ Pa}$

د - المحرار يشير إلى قيمة ثابتة خلال تطور الجملة $\theta = 27^\circ\text{C}$.

من أجل إستثمار الملاحظات و النتائج المتحصل عليها أجب على الأسئلة التالية :

3 - استنتاج سلم رسم البيان المعطى : P_1 , t_1

4 - عين المتفاعل المحد . على إجابتك

5 - جد قيمة التقدم الأعظمي x_{\max} و استنتاج كلاما من تركيز حمض كلور الهيدروجين C و الكتلة المستعملة m_0

6 - عرف زمن نصف التفاعل ثم بين أن عنده يكون : $P(H_2) = \frac{P_f(H_2)}{2}$ ثم أحسب قيمته .

7 - جد العبارة التي تمكّن من حساب سرعة تشكّل شوارد الألمنيوم ثم أحسب قيمتها الابتدائية . ($v_0(Al^{3+})$)

- كيف تتطور هذه السرعة ؟ فسر .

دراسة تأثير كلا من التركيز الابتدائي لشوارد الهيدرونيوم ودرجة الحرارة :

- نعيد التجربة من جديد مع مغيرين التركيز المولي الابتدائي لمحلول حمض كلور الهيدروجين فقط حيث : $C' > C$


8 - هل تتغير قيمة التقدم الأعظمي ؟ علل إجابتك .

9 - هل تتغير قيمة السرعة المحسوبة سابقا ؟ علل إجابتك .

10 - من أجل تغيير درجة الحرارة فقط حيث : $27^\circ C > \theta^\circ$. ما هو المقدار الفيزيائي المتغير ؟ ($v_0(Al^{3+})$) أو x_{\max} أو كلاهما .

- علل إجابتك ثم أرسم كيفييا مع المنحنى السابق المنحنى الجديد ($t' P_{H_2}$) من أجل هذا التغيير .

دراسة تأثير سطح التلامس : نستعمل التجهيز التجريبي السابق ونحقق ثلاث تجارب جديدة مغيرين حالة الألمنيوم فقط :



• التجربة 1 : ورقة الألمنيوم حديثة الصنع .

• التجربة 2 : مسحوق الألمنيوم

• التجربة 3 : ورقة الألمنيوم قديمة

نرسم البيانات $P_{H_2} = f(t)$ أنظر الشكل المقابل

11 - أنساب كل منحنى للتجربة الموافقة .

12 - اعتمادا على المنحنيات المتحصل عليها خلال التجربتين 1 و 2 فسر تأثير سطح التلامس مع المحلول على سرعة التفاعل .

13 - في وسط رطب يتغطى الألمنيوم بطبقة رقيقة من الألومين Al_2O_3 تلعب دورا وقائيا للألمنيوم

- إنطلاقا من بيان التجربة 3 بين مدى تأثير طبقة الألومين على سرعة التفاعل .

14 - بين أن العوامل الحركية المدروسة تسمح :

أ - بتبرير استعمال ورق الألمنيوم لمدة طويلة في حفظ المواد الغذائية .

ب - بإظهار خطورة حفظ المواد الغذائية الحمضية لمدة معينة وخاصة الساخنة منها و الأكثـر حـوشـة .

$$M(Al) = 27 \text{ g/mol} , \quad R = 8,31 \text{ SI} , \quad T(\text{°K}) = 273 + \theta^\circ(\text{C})$$

معطيات :

انتهى الموضوع - بال توفيق