

المدة : 04 ساعات و 30 د

اختبار الفصل الثاني في مادة : علوم الطبيعة و الحياة

على التلميذ أن يختار أحد الموضوعين الآتيين :


الموضوع الأول

التمرين الأول : (05 نقاط)

يرتبط نشاط البروتين ببنائه الفراغية التي تحددها مجموعة من الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبها، نريد التعرف على العلاقة بين بنية البروتين وظيفته المتخصصة ودور الأحماض الأمينية في ذلك .  
تبين الوثيقة (1) البنية الفراغية لإنزيم الليزوزيم .

المطلوب :

- 1- اكتب صيغة الحمضين الأمينيين Lys و Asp عند درجة pH=1 معلاً إجابتك ، ثم مثل صيغة ثانوي الببتيد المتشكل من إرتباط هذين الحمضين الأمينيين .
- 2- باستغلال معطيات الوثيقة و معلوماتك وضح في نص علمي سبب تباعد الأحماض الأمينية في الشكل (ب) . وقاربها في الشكل (أ) محدداً دور المورثة في ذلك .



عطى :  
 $R (\text{Asp}) = \text{CH}_2\text{-COOH}$   
 $R (\text{Lys}) = (\text{CH}_2)_4\text{-NH}_2$


التمرين الثاني : (07 نقاط)

يلجأ الأطباء إلى استعمال المثبّطات المناعية للتغلب على مشكلة رفض الطعم لدى المرضى في حالة عدم توفر المعطى المناسب ، سنتعرّف في هذه الدراسة على الإستجابة المناعية المتدخلة في رفض الطعم وتأثير المثبّطات المناعية عليها .

الجزء الأول :

لفهم بعض آليات الإستجابة المناعية المتدخلة في رفض الطعم ، نقترح عليك الدراسة الآتية :  
يمثل الشكل (أ) للوثيقة (1) ظروف ونتائج تطعيم الجلد عند فئران تتنمي إلى سلالات مختلفة : السلالة A (الفئران A<sub>1</sub> و A<sub>2</sub>) ، السلالة B (الفئران B<sub>1</sub> و B<sub>2</sub>) ، السلالة C و السلالة N : فئران بدون غدة تيموسية منذ الولادة (A<sub>2</sub> Nudes) .

التجربة	المعطى	المستقبل	النتائج
1	الطعم A1	A2	قبول الطعم
2	الطعم A1	B2 B1	رفض الطعم بعد 11 يوماً من طرف الفئران
3	الطعم A1	B1	رفض الطعم الثاني بعد 6 أيام
4	الطعم A1	N	قبول الطعم
5	الطعم C	B2	رفض الطعم C بعد 11 يوماً



الشكل (ب)

الوثيقة (1)

الشكل (أ)

١- ناقش معطيات الشكل (أ) من الوثيقة (١) مستخرجاً شرط قبول الطعام عند الفئران العاديّة و مميّزات الإستجابة المناعية المتداخلة في رفض الطعام .

2- السيكلوسبيورين (Cyclosporine) أحد أنواع المثبّطات المناعية ، لمعرفة طريقة تأثيره على نتائج التجربة التالية :  
 نحضر وسطاً تجربياً يحتوي على بقعيميات كبيرة ،  $LT_8$  ،  $LT_4$  ،  $LT_c$  مستخلصة من الفأر B و خلايا جلدية مستخلصة من الفأر A و ندرس تطور الخلايا  $LT_c$  في الوسط بوجود و بغياب السيكلوسبيورين ، النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (1) .

- بالإعتماد على معطيات الشكل (ب) من الوثيقة (1) اقترح فرضيتين تفسّر بهما طريقة تأثير السيكلوسبورين .

## الجزء الثاني :

للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين السابقتين ، تم استخلاص خلايا الطعم من فأر مُعطي من السلالة A و وسمها بالكروم المشع  $^{51}\text{Cr}$  الذي يحرر عند تخريبها .

الوسط	خلايا الطعم الموسومة مضاد إليها	كمية $^{51}\text{Cr}$ المحرر (و !)
1	لا شيء (وسط شاهد)	0
2	$\text{LT}_4 + \text{LT}_8$	0
3	بلغميات كبيرة + $\text{LT}_4 + \text{LT}_8$	300
4	بلغميات كبيرة + $\text{LT}_4 + \text{LT}_8$ + سيكلوسبورين	0
5	بلغميات كبيرة + $\text{LT}_4 + \text{LT}_8$ + سيكلوسبورين + $\text{IL}_2$	300
6	بلغميات كبيرة + $\text{LT}_8 + \text{IL}_2$ بتركيز محدود	100

توضع خلايا الطعم الموسومة في أوساط زرع ملائمة ثم تضاف إليها خلايا مناعية مستخلصة من فأر مستقبل من السلالة B ، يمثّل جدول الوثيقة (2) شروط ونتائج هذه التجربة .

- 1- حل النتائج التجريبية الممثلة في جدول الوثيقة (2).
  - 2- انجز رسمًا تخطيطيًا وظيفياً توضح من خلاله الدور الذي لعبت البالعات الكبيرة في الوسط 3.
  - 3- أشرح كيف يؤدي علاج المستقبل بمادة السيكلوسبورين إلى مساعدة جسمه على قبول الطعم.

### التمرين الثالث : (08 نقاط)

تحتاج عضوية الكائنات الحية لنموها وتطورها وقيامها بمختلف الوظائف الحيوية إلى إمداد منتظم بالمعذيات.


## الجزء الأول :

المقال العلمي التالي مأخوذ من أحد المجالات العلمية :

"... الأشجار النفضية هي الأشجار التي تسقط أوراقها خلال فصل الخريف و تبقى عارية طوال فصل الشتاء إلا أنَّ هذا النوع من الأشجار يبقى حيَا و لا يتلف و تظهر أوراقها من جديد مع بداية فصل الرَّبيع ... ".

- 1- حدد المشكل العلمي المطروح .
  - 2- قدم فرضية تُجيب فيها عن المشكل العلمي المطروح .


للاجابة عن المشكل العلمي المطروح سابقاً نقترح عليك الدراسة التالية :  
لمعرفة بعض شروط التحولات الطاقوية التي تحدث على مستوى عضية الشكل (2) من الوثيقة (1) نحقّق تجارب  
نستعمل فيها بعض عناصر العضية (ع) في وجود الضوء .  
- النتائج التجريبية وشروطها ممثلة بالشكل (1) من الوثيقة (1) .



- باستغلالك للوثيقة (١) ، استنتج شروط التحولات الطاقوية التي تحدث على مستوى العضية (٤) .

2- دراسة الآليات و البنيات المتدخلة في تحويل الطاقة على مستوى العضية (ع) نقدم التجارب التالية :

التجربة (1) : نحضر وسطين و نزود كلّ منها بكميات محددة من  $\text{NADP}^+$  و  $\text{Pi}$  و  $\text{ADP}$  في وجود الضوء و غاز  $\text{CO}_2$  حيث :



الوثيقة 1- أ

- الوسط الأول نضيف إليه العناصر (1) من العضية (ع) .

- الوسط الثاني : نضيف إليه العناصر (1) و العناصر (2) من العضية (ع) .

- النتائج المتحصل عليها ممثلة بالشكلين (1) و (2) على التوالي في الوثيقة ( 1 - أ ) .

التجربة (2) :

نحضر معلقاً من العضيات (ع) في وسط مناسب في وجود  $\text{CO}_2$  و تغيرات تركيز المادة (X) المبيئة في العضية (ع) من الوثيقة (1) .


الشروط التجريبية و النتائج المتحصل عليها ممثلة بالوثيقة (1- ب) .

الوثيقة (1- ب)

تجربة (3) :

- الشكل أ: رسم تخطيطي لمقطع عرضي في جذر أحد الأشجار النفضية.

- الشكل ب: رسم تخطيطي لخلايا مأخوذة من البرانشيم القشرى.



قام العلماء بإنجاز مقاطع عرضية في جذر أحد أشجار هذا النوع (الأشجار النفضية) في فصل الشتاء.

- النتائج ممثلة في الوثيقة (2) مع العلم أنّ المادة (س) تُعطى تفاعلاً إيجابياً مع ماء اليود في حين المادة (ع) تُعطى تفاعلاً إيجابياً مع (كبريتات النحاس + الصودا) .

- باستدلال منطقي برهن صحة الفرضية المقترحة في الجزء الأول من التمارين . مدعّماً إجاباتك بمعادلات كيميائية.

الجزء الثالث :


من خلال ما توصلت إليه في هذه الدراسة و معارفك ، انجز رسمًا تخطيطياً وظيفياً تبيّن فيه التحول الطاقوي الذي يحدث على مستوى العضية (ع) .

انتهي الموضوع الأول

## الموضوع الثاني

### التمرين الأول : (50 نقاط)

يحتاج تركيب البروتين في الخلية على شكل تتابع لأحماض أمينية إلى ترجمة نسخة من المعلومة الوراثية المحمولة على ARNm.



- 1- اكتب البيانات المرقمّة من 1 إلى 7 من الوثيقة (1) ، ثم اقتراح عنوانا مناسبا لها .
  - 2- باستغلالك للوثيقة و من مكتسباتك القبلية ، اشرح في نص علمي كيف يتم فك رموز الشفرة الوراثية و تحويلها من لغة نوبية إلى لغة بروتينية ؟

### التمرين الثاني : (07 نقاط)

تؤدي الإنزيمات دوراً فعالاً في حياة الكائنات الحية نظراً للوظائف العديدة التي تقوم بها ، و تختلف أدوارها باختلاف المواد التي تؤثر عليها .

غاز الحروب المسمى بـ: **السارين** صيغته الكيميائية  $(C_4H_{10}FO_2P)$  سريع الانتشار في الهواء ، عديم الرائحة و اللون ، عند استنشاقه يمكن أن يسبب الوفاة في وجود كميات ضئيلة منه ، يسمى هذا النوع من الغازات بـ: **الغازات السمية العصبية** ، من أهم الأعراض التي يسببها : صداع حاد ، تشنج العضلات ، إسهال ، الإفراط في إفراز اللعاب و توقف التنفس .

يؤدي غاز السارين إلى الموت في الساعات الأولى إذا لم يعطى للشخص المستنشق له دواءً يسمى : المضاد السمي .


لفهم تأثير غاز الحرب على النشاط الإنزيمي نقترح عليك الدراسة التالية :

## الجزء الأول :

الأستيل كولين إستيراز (ACHE) هو إنزيم يحفّز التفاعل التالي :




- ظهر الوثيقة (1-أ) نمذجةً لتفاعل الذي يُشرف عليه إنزيم الأستيل كولين إستيراز مع إهمال و عدم تمثيل جزيئة الماء في هذه النمذجة .



- في نفس الشروط التجريبية و نفس كمية الإنزيم تم قياس السرعة الإبتدائية للتفاعل الذي يُشرف عليه إنزيم الأستيل كولين إستيراز في غياب و في وجود كمية قليلة جدًا من غاز السارين .

النتائج المحصل عليها مدونة في الوثيقة (1- ب) ، بينما تمثل الوثيقة (1- ج) و الوثيقة (1- د) العلاقة بين الإنزيم و مادة التفاعل في حالات مختلفة و هذا في غياب و وجود مواد خارجية .




1- قدم تحليلًا للوثيقة (1) .

2- اقترح فرضيتين تفسّر بهما تأثير غاز السارين على النشاط الإنزيمي .

## الجزء الثاني :

لفهم الأعراض التي يسببها هذا الغاز و للتأكد من مدى صحة الفرضيات التي تم اقتراحها في الجزء الأول نقدم لك الوثيقة (2) حيث :

تمثل الوثيقة (2- أ) بنية جزيئة غاز السارين ، بينما الوثيقة (2- ب) توضح نمذجةً لتأثير هذا الغاز على نشاط إنزيم الأستيل كولين إستيراز .



لتلافي خطر غاز السارين يستعمل الجنود دواءً مضاداً يُسمى البراليدوكسيم (Paralidoxime) في الساعات الأولى بعد استنشاقهم له في ظرف لا يتعدي 5 ساعات .

تمثل الوثيقة (2- ج) بنية جزيئة البراليدوكسيم ، أما الوثيقة (2- د) فتبين آلية نشاطه .

- باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2) :

1- برر تسمية غاز السارين بغاز السم العصبي ، مصادقاً على صحة الفرضيات المقترحة في الجزء الأول من التمارين .


2- وضح دور البراليدوكسيم في تلافي خطر غاز السارين .

### التمرين الثالث : (08 نقاط)

تلعب المشابك دوراً هاماً في إنتقال الرسائل العصبية أو تثبيطها وبالتالي ضمان العمل المنسق للعضلات ، من أجل دراسة التخصص الوظيفي للبروتينات في نقل المعلومات العصبية نحقق الدراسة التالية :

#### الجزء الأول :

توضّح الوثيقة (1) التركيب التجاري و النتائج المحصل عليها إثر تطبيق ثلاثة تبيهات مستقلة في (St1 ثم St2 ثم St3) .



- النتائج موضحة في المنحنيات a ، b ، c من ذات الوثيقة.

1- حل التسجيلين a و b ثم سُم التسجيل c وبين تأثيره على الألياف العضلية بعد وصوله إليها .


2- قدم تفسيراً على المستوى الشاردي والجزيئي للأجزاء :

من 10 إلى ms 15 : بالنسبة للمنحي a .

من 5 إلى ms 10 : بالنسبة للمنحي c .

#### الجزء الثاني :

بهدف دراسة تأثير الإزرين Esérine (مادة مستخرجة من أحد النباتات لها استعمالات طبية ذات أهمية للمصابين بمرض **الزهايمر** ، الوهن العضلي، مرض الشلل ، الرعاش ...) على إنتقال الرسالة العصبية على مستوى المشابك العصبية فلما بإجراء التجارب التالية :



التجربة 1 :  
فمنا بوضع عضلة موصولة بعصبها داخل محلول فيزيولوجي يحتوي على الاستيل كولين مع أو بدون الإزرين ، ثم قمنا بقياس سعة التقلص العضلي في كل من الحالتين .  
النتائج المحصل عليها موضحة في الوثيقة (2).

1- قارن بين النتائج الممثلة في الوثيقة (2) ، ثم اقترح فرضيات تفسّر بها طريقة تأثير الإزرين .

#### التجربة 2 :

تم إحداث تبيه فعال في الخلية قبل المشبكية مع تتبع كمية الاستيل كولين في الشق المشبك في غياب وجود الإزرين .

- النتائج المحصل عليها ممثلة في الجدول (أ) من الوثيقة (3) .

	8	7	6	5	4	3	2	1	الزمن (ms) بعد التبيه
0	0	0	10	15	20	10	3		كمية Ach في الشق المشبك في غياب الإزرين (و-)
16	17	18	19	20	20	10	3		كمية Ach في الشق المشبك في وجود الإزرين (و-)

(الشكل - 03 - )

### التجربة 3 :

تم قياس تركيز كل من شوارد الكالسيوم ( $Ca^{+2}$ ) في هيولى التهابية قبل المشبكية و نشاط إنزيم الأستيل كولين إستيراز في الشق المشبكي في وجود مادة الإزرين و في غيابها .

- النتائج المحصل عليها ممثلة في الجدول (ب) من الوثيقة (3) .

وجود الإزرين	غياب الإزرين		الشكل -03-(ب)
150	150	تركيز شوارد $Ca^{+2}$ في النهاية قبل المشبكية (و . !)	
52	100	نشاط إنزيم الأستيل كولين إستيراز في الشق المشبكي (%)	

1- ترجم معطيات الجدول (3-أ) إلى منحنى بياني، ثم استدل من خلال نتائج التجارب (2) و (3) على صحة إحدى فرضياتك المقترحة سابقاً .

2- اشرح تغيير سعة التقلص العضلي في وجود و غياب مادة الإزرين .

### الجزء الثالث :

من خلال المعلومات المستخرجة من هذه الدراسة و معارفك المكتسبة ، اشرح على المستوى الجزيئي و الشاردي آلية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشابك المختلفة ، مبرزا دور البروتينات في ذلك .

### انتهي الموضوع الثاني

بالتوقيق