



اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة الطائق) المدة : 04 سا و 30 دقيقة.


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على 04 صفحات (من الصفحة 01 من 08 إلى الصفحة 04 من 08)

التمرين الأول: (05 نقاط)



1- من أجل تحضير المركب (X) وهو 2-(ثنائي إيثيل أمينو) إيثيل 4-أمينوبنزوات (2 -(diethylamino) ethyl 4-aminobenzoate)







المعروف باسم مخدر موضعي، معد للحقن يستخدم في التخدير الشوكي، الأمراض العصبية والتشنجات والألم الرثوي (الروماتزم) وكذلك للحصول على تأثير مديد للبنسلين بمشاركته معه لأنه يعطي معه مركب ضعيف الذوبان ينحل في المذيبات العضوية ببطء .

جري سلسلتين من التفاعلات :

من جهة:



و من جهة أخرى :



- استنتج الصيغة نصف المفصلة للمركبات: A , B , C, D, E,F, G,H, I , HCl

2- بلمرة المركب D تعطي بوليمير J .

أ- مانوع البلمرة؟

ب- اكتب معادلة التفاعل الحادثة.

ت- استنتاج الكتلة المولية المتوسطة للبوليمير إذا علمت أن درجة البلمرة تقدر بـ 1700.

يعطى: $M_c=12\text{g/mol}$, $M_H=1\text{g/mol}$, $M_O=16\text{g/mol}$, $M_N=14\text{g/mol}$

التمرين الثاني: (05 نقاط)

I - يتكون زيت من 5% من الحمض الدهني (A) و 45% من ثلاثي الغليسيريد (B) و 50% من ثلاثي الغليسيريد (C) .

✓ تعديل 2,82g من الحمض الدهني (A) يتطلب 20mL من NaOH 0,5N .

✓ أكسدة الحمض الدهني (A) ببرمنغات البوتاسيوم المركز و في وجود حمض الكبريت المركز تعطي حمض ثنائي الوظيفة له 9 ذرات كربون و حمض أحادي الوظيفة.

1. احسب الكتلة المولية للحمض الدهني (A).

2. استنتاج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني (A).

✓ ثلاثي الغليسيريد (B) له دليل تصبغ Is=208,4 متجانس و يتكون من حمض دهني مشبع F.

3 . احسب الكتلة المولية لثلاثي الغليسيريد (B) و أكتب صيغته نصف المفصلة.

✓ يتكون ثلاثي الغليسيريد (C) من حمضين من الحمض الدهني (A) و حمض واحد من الحمض الدهني (F).



4 . أوجد الكتلة المولية لثلاثي الغليسيريد (C).

5 . أوجد دليل الحموضة Ia ، دليل التصبغ Is و دليل اليود Ii لهذه العينة من الزيت.

يعطى: $M_I=127\text{g/mol}$, $M_c=12\text{g/mol}$, $M_H=1\text{g/mol}$, $M_O=16\text{g/mol}$

$M_K=39\text{ g/mol}$, $M_{Na}=23\text{g/mol}$

ـ لديك الاحماس الأمينية التالية:

الأسبارتيك Asp	الهستدين His	الтриبتوفان Trp
$\text{HOOC}-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$ pKa ₁ =1,88 pKa ₂ =9,60 pKa _R =3,66	 pKa ₁ =1,82 pKa ₂ =9,17 pKa _R =6,00	 pKa ₁ =2,83 pKa ₂ =9,39

1. صنف الاحماس الأمينية السابقة.

2. اكتب الصيغ الأيونية للحمض الاميني (His) عند تغير الـ pH من 1 الى 14.

3. مثل الصورتين L و D للحمض الاميني (Trp).

4. وضعت الاحماس الأمينية السابقة في جهاز الهجرة الكهربائية الذي يحتوي على محلول منظم ذو $\text{pH}=5,7$

أ - أوجد الصيغ الأيونية المتواجدة لحمض الاسبارتيك و الحمض الاميني триبتوفان وحدد الصيغ السائدة.

ب - مثل الاحماس الأمينية السابقة على مخطط الهجرة مع الشرح.


5. نجري على البيرتيد (X) و (Y) تحليل بيوري .
- اكمل الجدول.

النتيجة (إيجابي/سلبي)	لون المعقد	يتشكل معقد	يتتفاعل مع بيوري	
.....	البيرتيد X
.....	البيرتيد Y

التمرين الثالث: (06 نقاط)

I - نضع $m=0,8624\text{g}$ من حمض البنزويك الصلب في مسعر حراري اديباتيكي يحتوي على 1046g من الماء، نلاحظ ارتفاع درجة الحرارة من $C = 24^\circ$ إلى $T_1 = 27,5^\circ$ $T_2 = 24^\circ$ بعد احتراق العينة بالأكسجين.

يعطى : $C_6\text{H}_5-\text{COOH(s)}$ و معادلة الاحتراق هي :



علماً أن : $M_O=16\text{g/mol}$ $M_c=12\text{g/mol}$ $M_H=1\text{g/mol}$ $Cp(\text{H}_2\text{O})_{(l)}=75,24\text{j/mol.k}$

1. ما هي كمية الحرارة Q_1 الناتجة عن احتراق حمض البنزويك الصلب؟.

2. احسب السعة الحرارية للمسعر.

3. أوجد الانطاليبي المعياري ΔH°_f لتشكل حمض البنزويك الصلب .


يعطى : $\Delta H^\circ_f(\text{CO}_2)_{(g)}=-393\text{kJ/mol}$ ، $\Delta H^\circ_f(\text{H}_2\text{O})_{(l)}=-286\text{kJ/mol}$

4. أوجد أنطالبي الإحتراق لحمض البنزويك الصلب عند $T = 110^\circ C$ ، علماً أن الماء يتبخّر عند $T = 100^\circ C$

يعطى :

المركب	$C_6H_5-COOH(s)$	$O_2(g)$	$H_2O(l)$	$H_2O(g)$	$CO_2(g)$
$C_P(j/mol.k)$	146,7	29,37	75,24	33,58	37,58
$T_{vap}=100^\circ C$ $\Delta H_{vap}=40,7 \text{ Kj/mol}$					

II - يخضع 1mol من غاز مثالي إلى التحويلين المتاليين حسب المخطط التالي:



	P(atm)	V(L)	° T(C)
A	$P_A=5$	$V_A=2$	$T_A=25$
B	$2P_A$	V_A	T_B
C	P_A	$2V_A$	$T_C=T_B$

1. حدد طبيعة التحول (AB) و التحول (BC).

2. احسب درجة الحرارة T_B .

3. احسب العمل للتحول (AB) و التحول (BC).

$$1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa} , \quad R = 8.314 \text{ J/mol.K}$$

التمرين الرابع: (04 نقاط)

مسعر حراري كتلته و هو فارغ $m_1 = 219,1 \text{ g}$ نضع فيه كتلة من الماء البارد ثم نزن كتلة الجملة (المسعر و الماء $m_2 = 365,7 \text{ g}$) و نقيس درجة الحرارة الإبتدائية $T_1 = 20,4^\circ C$ ، ثم نضيف كتلة m_3 من الجليد درجة حرارتها $C = 3^\circ C$. ثم نزن الجملة (المسعر و الماء و الجليد $m_3 = 387,7 \text{ g}$) و نقيس درجة الحرارة عند التوازن $T_f = 10,6^\circ C$.

1. احسب الحرارة النوعية لانصهار الجليد L_{fus} .

2. استنتج الأنطالبي المولي لانصهار الجليد ΔL_{fus} .

3. اكتب معادلة إنصهار الجليد.

$$C_e = 4,185 \text{ J/g.K} , \quad C_g = 2.09 \text{ J/g.K} \quad \text{يعطى :}$$

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على 04 صفحات (من الصفحة 05 من 08 إلى الصفحة 08 من 08)

التمرين الأول: (05 نقاط)










I. مركب عضوي أكسجيني (X) صيغته العامة C_xH_yO أثناء الاحتراق التام لحجم قدره ($V_x=112mL$) من المركب (X) ، يتشكل ($V=448mL$) من غاز أكسيد الكربون و ($m=0,45g$) من الماء. علماً أن الحجوم مقاسة في نفس الشروط النظامية .

أ- اكتب معادلة الاحتراق التام للمركب العضوي (X).

ب- أوجد الصيغة الجزيئية المحمولة لهذا المركب.

ج- أوجد الصيغ نصف المفصلة الممكنة للمركب (X).

II - يدخل المركب (X) في سلسلة التفاعلات التالية:



أ- أوجد الصيغة نصف المفصلة الممكنة للمركبات: A, B, C,D ,E ,F ,G ,H ,I ,J ,X . علماً أن A يتفاعل مع DNPH و عند مفاعলته مع كاشف طولنس يظهر مرآة فضية.


- بـ. ما اسم التفاعل (2) و التفاعل (10)?

تـ. اكتب مقطع من البوليمير يحتوي على وحدتين بنائيتين.

ثـ. إذا كانت درجة البلمرة للبوليمير هي 5000، احسب الكتلة المولية المتوسطة للبوليمير.

التمرين الثاني: (05 نقاط)

I. في عينة من مادة دهنية تكون من أحادي غليسيريد متجانس (MG) نسبة الاكسجين فيه 19,51% و ثاني غليسيريد متجانس (DG) نسبة الاكسجين 17,543% أو ثلاثي غليسيريد متجانس (TG) نسبة الاكسجين فيه 11,91% كما يلى :



بغرض معرفة الاحماض الدهنية التي تتكون منها المركبات السابقة لدينا ما يلي:

- الحمض الدهني A : تتفاعل كتلة منه قدرها $3,8\text{g}$ مع كتلة من اليود قدرها $3,8\text{g}$ و يرمز له $\text{Cn}:1\Delta^9$
 - الحمض الدهني B : تعديل كتلة منه قدرها 1g يتطلب 10mL $0,5\text{mol/L}$ NaOH من الصودا لا يتفاعل مع اليود.
 - الحمض الدهني C : ناتج من هدرجة الحمض الدهني A.
 1. أوجد الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني A و C.
 2. برهن أن علاقة الحموضة للحمض الدهني B تكتب كما يلي : $1a = 5M_{\text{NaOH}}$ و احسب قيمتها .
 3. استنتج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني B و رمزه المختصر.
 4. استنتاج الصيغة نصف المفصلة للمركبات السابقة (MG) و (DG) و (TG).


$$M_I = 127 \text{ g/mol}, \quad M_c = 12 \text{ g/mol}, \quad M_H = 1 \text{ g/mol}, \quad M_O = 16 \text{ g/mol} \quad \text{پھر:}$$

$$M_K = 39 \text{ g/mol}, \quad M_{Na} = 23 \text{ g/mol}$$

1. استنتاج ماهية هذه المكونات انتلاقاً من الوثيقة (1) و الوثقة (2).

المميزات	المركب
غير فعال ضوئياً	B
يتفاعل مع كزانتوبروتيك	C
نزع مجموعة الكربوكسيل منه تعطي	D
$\text{H}_2\text{N}-\text{H}_2\text{C}-\left(\text{CH}_2\right)_3-\text{NH}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$	

الوثيقة(1)

pKa _R	pKa ₂	pKa ₁	صيغته (الجذر-R-) (الحمض الاميني
8,18	10,28	1,96	-CH ₂ -SH	Cys سستيدين
12,48	9,04	2,17	- $\left(\text{CH}_2 \right)_3 \text{NH}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$	الأرجينين Arg
10,07	9,11	2,20	-CH ₂ -  -OH	التيروزين Tyr
-----	9,60	2,34	-H	الغليسين Gly

الوثيقة (2)

2. اكتب صيغة المركب (B-D-A-C) (B-D-A-C) عند pH=1 و pH=12 .


3. كيف نكشف عن هذا المركب تجريبيا مع الشرح .

- لفصل مكونات المزيج من الوحدتين D , A وضعت هذه المركبات في جهاز الهجرة الكهربائية عند pH=5,97 .

4. جد الصيغة الأيونية المتواجدة و الصيغة السائدة للمركب D عند pH=5,97 و الشكل الأيوني الذي تهجر به .

5. وضح على مخطط الهجرة اتجاه كل حمض أميني مع التعليل .

التمرين الثالث: (06 نقاط)



الشكل (1)

I- السكاروز أو سكر المائدة عبارة عن أوزيد ثلائي يستخلص من القصب أو الشمندر، صيغته الجزيئية العامة هي (C₁₂H₂₂O₁₁) . نقوم بحرق كتلة m_S=3.42 g من هذا السكر الصلب في مسurer حراري (الشكل 1) سعته الحرارية C_{cal}=240 J/K و يحتوي على كتلة (m_{eau}=500g) من الماء عند درجة حرارة p= 1 atm , T₁=25°C .

1. اكتب معادلة احتراق السكاروز الصلب.

2. احسب الأنطاليبي المولي للمعياري لاحتراق السكاروز الصلب . ΔH°_{com}

$$\text{علمـاً أنـ: } R=8,314 \text{ J/mol.K} \quad \Delta U=-2426 \text{ kJ/mol} \quad \text{يعطـى: } C_{eau}=4,185 \text{ J/g.K}$$

3. أـ ما هي كمية الحرارة Q بـ Kj الناتجة عن احتراق السكاروز داخل المسurer؟

$$\text{يعطـى: } C_{eau}=4,185 \text{ J/g.K}$$

بـ استنتاج درجة حرارة التوازن T_{eq} داخل المسurer .


جـ اعطـى البيانات المرقمة من 1 إلى 6 في الشكل (1) .

دـ إذا اعتـبرنا أنـ المسurer مصنوع من النحاس Cu ، أـحسب كتلة المسurer ، علمـاً أنـ الحرارة المولـية للنحـاس C_{Cu}=25,4 J/mol.K و الكتلة المولـية M_{Cu}=63,5g/mol .

4. احسب الأنطاليبي المولي لتشكل السكاروز الصلـب ΔH°_{f(C₁₂H₂₂O₁₁(s))}

$$\Delta H°_{f(CO_2(g))} = -393 \text{ kJ/mol} \quad \Delta H°_{f(H_2O(l))} = -286 \text{ kJ/mol} \quad \text{يعطـى: }$$

II- لديك مخطط تشكيل البروبان السائل $C_3H_6O_{(l)}$ التالي :



1. اكمل المخطط السابق .


2. احسب قيمة أنطابقي تشكيل البروبان السائل ($C_3H_6O_{(l)}$)

يعطى: $\Delta H_{vap}^\circ(C_3H_6O) = 29,7 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{sub}^\circ(C_{(s)}) = 717 \text{ kJ/mol}$

الرابطة	C-C	C=O	O=O	C-H	H-H
$\Delta H_d^\circ(\text{kJ/mol})$	347	749	498	410	437

التمرين الرابع: (04 نقاط)

نقوم بدراسة تفاعل إماهة 2- بروموميثيل بروبان $(CH_3)_3CBr$ في مذيب يتكون من الماء والأسيتون وفق المعادلة التالية :



t (min)	0	2	4	8	12	20	30	40
C (mol/l)	0,100	0,090	0,080	0,065	0,052	0,033	0,019	0,011

- اثبت أن التفاعل من الرتبة الأولى.
- احسب ثابت السرعة K بطريقتين .
- احسب زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.
- ما هو الزمن اللازم لتفاعل 70% من التركيز الابتدائي من 2- بروموميثيل بروبان ؟

انتهى الموضوع الثاني