

ثانوية : أفلح بن عبد الوهاب - تيارت

السنة الدراسية : 2022/2021

المدة : 02 ساعة


اختبار الثلاثي الثاني للسنة أولى ثانوي

الشعبة : جذع مشترك علوم و تكنولوجيا

اختبار في مادة : العلوم الفيزيائية

### التمرين الأول : ( 08 نقاط )

من موضع  $M_0$  نفذ بسرعة ابتدائية  $v_0$  يصنع شعاعها زاوية  $\alpha$  مع الأفق كررة (S) نعتبرها نقطية ، الشكل التالي يمثل التصوير المتعاقب لحركة هذه الكرة حيث  $s = 0,2$  s .



- أحسب سرعة الكرة عند الموضع  $M_1$  ،  $M_3$  ،  $M_5$  ،  $M_7$  ، ثم مثل شعاع السرعة عند هذه المواقع و كذا شعاع تغير السرعة عند المواقع  $M_2$  ،  $M_4$  ،  $M_6$  ،  $M_8$  بأخذ السلم: 1 cm → 4 m/s .
- ماذا يمكن قوله عن شعاع القوة المؤثرة  $\bar{F}$  المؤثرة على الكرة (S) ؟
- مثل مركبتي شعاع السرعة  $\vec{v}_x$  ،  $\vec{v}_y$  عند المواقع  $M_1$  ،  $M_3$  ،  $M_5$  ،  $M_7$  . ماذا تستنتج فيما يخص مسقط حركة الكرة على المحور  $OX$  ؟
- أوجد  $h$  أقصى ارتفاع تبلغه الكرة بالنسبة للمحور  $OX$  و الزمن اللازم لذلك .
- عرف المدى ، حدد قيمته  $L$  و حدد الزمن اللازم لبلوغه .
- قارن زمن بلوغ المدى بزمن بلوغ الذرة ، ماذا تستنتج ؟

## التمرين الثاني : ( 06 نقاط )



البراسيتامول نوع كيميائي يستعمل في الصناعة الصيدلانية صيغته الجزيئية  
المجملة  $C_8H_9O_2N$  .

- 1- احسب الكتلة المولية للبراسيتامول .
  - 2- احسب كتلة 0,2 mol من البراسيتامول .
  - 3- احسب عدد الجزيئات في 1,51 g من البراسيتامول .
  - 4- نذيب قرصا من البراسيتامول في الماء فيتكون نتية لذلك غاز ثانوي أكسيد الكربون ، بواسطة تجهيز مناسب ، قيس حجم هذا الغاز عند درجة الحرارة  $C = 25^\circ C$  و الضغط  $P = 10^5 Pa = \theta$  فكانت النتيجة  $V = 90 mL$  .
    - أ- اعط عبارة قانون الغاز المثالي .
    - ب- اعتمادا على هذه العبارة اثبت أن الحجم المولى في شروط كيفية من الضغط و درجة الحرارة يعطى بالعبارة التالية  $V_M = \frac{RT}{P}$  ، احسب قيمته في شروط التجربة .
    - ج- احسب بطريقتين مختلفتين كمية مادة غاز أكسيد الكربون  $CO_2$  المنطلق .
- يعطى :  $M(C) = 12 g/mol$  ،  $M(H) = 1 g/mol$  ،  $M(O) = 16 g/mol$  ،  $M(N) = 14 g/mol$  .  
 $1 mL = 10^{-3} L = 10^{-6} m^3$  ،  $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} mol^{-1}$  ،  $R = 8,31 \text{ SI}$

## التمرين الثالث : ( 06 نقاط )



يحتوي عصير البرتقال الطبيعي إلى جانب مكونات أخرى على الغليكوز glucose صيغته  $C_6H_{12}O_6$  ( سكر ) .  
قارورة عصير برتقال سعتها 1 لتر تحتوي على كتلة  $m_G = 45 g$  .

1. احسب الكتلة المولية الجزيئية للغليكوز .
  2. احسب التركيز الكتلي  $C_m$  للغليكوز في العصير و التركيز المولى  $C$  له .
  - 3- نأخذ كأسا من عصير البرتقال السابق حجمه  $V_0 = 20 mL$  ، نفرغ الكأس في حوجلة عيارية سعتها 100 mL  
ثم نضيف الماء حتى بلوغ الخط العياري .
    - أ- كيف نسمى هذه العملية ؟ و ما الفائدة منها ؟
    - ب- احسب معامل التمدد .
  - ج- احسب بطريقتين التركيز المولي الجديد للغليكوز المخفف في الحوجلة .
- يعطى :  $M(O) = 16 g/mol$  ،  $M(C) = 12 g/mol$  ،  $M(H) = 1 g/mol$

## الوثيقة المرفقة (تُعاد مع ورقة الإجابة)

ملاحظة : التمثيل يكون على هذه الوثيقة بدقة و بعناية مع استخدام قلم الرصاص و الألوان .

الاسم و اللقب : .....  
القسم : .....  
الفوج : .....

