

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (07 نقاط)

- I أمين أولي X نسبة الكربون فيه 53.3% ونسبة الهيدروجين 15.59%.





1) أوجد الصيغة المجملة للمركب X. ثم أكتب صيغته نصف المفصلة.

2) تحصلنا على المركب X من تفاعل هدرجة المركب Y الذي صيغته من الشكل R-CN.

- أكتب التفاعل الحادث مع توضيح صيغة المركب Y.

يعطى: $M_H = 1 \text{ g.mol}^{-1}$, $M_C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$, $M_N = 14 \text{ g.mol}^{-1}$

- II انطلاقاً من المركب Y نجري سلسلة التفاعلات التالية:




1) عين الصيغ نصف المفصلة للمركبات A , B , C , D , E , F , G .

2) ما اسم التفاعل رقم 7 ؟ واستنتج مردوده علماً أن المزيج متساوي المولات؟

- III لتحضير المركب F في المخبر قمنا بمزج 3ml من الكحول البنزيلي $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ مع 1.5ml من NaOH و

5g من KMnO_4 مع إضافة HCl على المزيج التفاعلي الناتج وهذا باستعمال تركيب تجاري مناسب تعطى

معادلة التفاعل الحاصل:



(1) ما الهدف من إضافة HCl؟ اكتب معادلة التفاعل الحادث.

(2) أحسب عدد مولات كل من الكحول البنزيلي وبرمنغنات البوتاسيوم، ثم استنتج المتفاعل المحد.

(3) جد الكتلة التجريبية المتحصل عليها من حمض البنزويك إذا كان مردود التفاعل هو: $R=85.22\%$.

يعطى: $M_H=1\text{g.mol}^{-1}$, $M_C=12\text{g.mol}^{-1}$, $M_O=16\text{g.mol}^{-1}$, $M_{Mn}=55\text{g.mol}^{-1}$, $M_K=39\text{g.mol}^{-1}$

$$\rho(C_6H_5-\text{CH}_2-\text{OH})=1.04\text{g/cm}^3, (MnO_4^- / MnO_2), (C_6H_5-\text{COO}^- / C_6H_5-\text{CH}_2-\text{OH})$$

التمرين الثاني: (07 نقاط)

-I ثلائي غليسيريد غير متجانس (DG) يدخل في تركيبه:

- حمض دهني A ناتج أكسدته بواسطة $KMnO_4$ في وسط حمضي حمضين كربوكسيليين من الشكل



- حمض دهني B مشبع نسبة الكربون فيه (75%).

(1) استنتاج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني A، وأكتب رمزه.

(2) أوجد الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني B.

(3) أكتب الصيغة نصف المفصلة الممكنة لثلائي الغليسيريد DG.

(4) أحسب قرينة اليود I_1 وقرينة التصبن I_s لثلائي الغليسيريد DG.

(5) تحتوي عينة من مادة دهنية على 80% من ثلائي الغليسيريد DG السابق و 20% من الحمض الدهني A.

- أحسب قرينة التصبن I_s لهذه العينة.

يعطى: $M_K=39\text{g.mol}^{-1}$, $M_I=127\text{g.mol}^{-1}$, $M_H=1\text{g.mol}^{-1}$, $M_O=16\text{g.mol}^{-1}$, $M_C=12\text{g.mol}^{-1}$

-II لديك رباعي الببتيد التالي: Asp-Cys-Ala-Lys

(1) أكتب الصيغة نصف المفصلة لرباعي الببتيد، واعط تسميته.

(2) أكتب الصيغة نصف المفصلة لرباعي الببتيد عند $pH=1$.

(3) أعطى التحليل المائي لهذا الببتيد أربعة أحماض أمينية

أ- صنف هذه الأحماض الأمينية.

ب- أكتب الصيغ الأيونية للحمض الأميني Cys عند تغير الـ pH من 1 إلى 13.

(4) نضع مزيجاً من الأحماض الأمينية التالية: Cys, Ala, Lys في جهاز الهجرة الكهربائية عند $pH=6$

- ووضح بالرسم موقع هذه الأحماض الأمينية على شريط الهجرة الكهربائية، مع التعليل.

pK_{a_R}	pK_{a_2}	pK_{a_1}	الجزر	المركب
3.66	9.60	1.88	$-\text{CH}_2-\text{COOH}$	Asp
8.18	10.28	1.96	$-\text{CH}_2-\text{SH}$	Cys
///	9.69	2.34	$-\text{CH}_3$	Ala
10.53	8.95	2.18	$-(\text{CH}_2)_4-\text{NH}_2$	Lys

التمرين الثالث: (06 نقاط)

-I مسعر معزول حراريا يحتوي على كتلة $m_1=200\text{g}$ من الماء عند درجة الحرارة $T_1=35^\circ\text{C}$ نضيف له قطعة من الجليد كتلتها $m_2=50\text{g}$ عند الصفر المئوي (0°C)، فكانت درجة الحرارة عند التوازن $T_f=14,9^\circ\text{C}$

(1) أحسب الحرارة النوعية لانصهار الجليد L_f .

(2) أحسب الحرارة المولية لانصهار الجليد ΔH_{fus} .

المعطيات:

$$c_{\text{eau}}=4,185\text{J/g.K}, C_{\text{cal}}=150\text{J/K}, M(\text{O})=16\text{g/mol}, M(\text{H})=1\text{g/mol}$$

-II الهيدرازين N_2H_4 يستعمل في وقود المحركات النفاثة ومحركات الصواريخ يحترق بسهولة في وجود أكسجين الهواء ويحرر كمية كبيرة من الطاقة وفق معادلة التفاعل الحراري التالية:



نجري تفاعل احتراق لحجم $V=3,2\text{ml}$ من الهيدرازين في مسعر حراري معزول سعته الحرارية مهملاً يحتوي على كمية كافية من الماء، فكانت كمية الحرارة الناتجة من التفاعل $62,22\text{kJ}$.


(1) أحسب كمية مادة الهيدرازين.

يعطي:



$$M_N=14\text{g.mol}^{-1}, M_H=1\text{g.mol}^{-1}, \rho_{(\text{N}_2\text{H}_{4(l)})}=1.0045\text{g/ml}$$

(2) استنتاج قيمة أنطالبي تفاعل الاحتراق ΔH_{comb} .

-III يتفاعل الهيدرازين كذلك مع غاز الهيدروجين وفقاً لمعادلة التفاعل التالي:



(1) أحسب أنطالبي التفاعل السابق باستغلال معادلات التفاعل التالية:



(2) استنتاج أنطالبي تشكل غاز النشادر $\text{NH}_{3(g)}$.

(3) بالاعتماد على مخطط التشكيل تأكد من قيمة $\Delta H_{\text{f}(\text{NH}_3)\text{(g)}}$ المحسوبة سابقاً.

المعطيات:

$$\Delta H_{\text{d}(\text{N}\equiv\text{N})}=945\text{ kJ/mol}, \Delta H_{\text{d}(\text{H}-\text{H})}=436\text{ kJ/mol}, \Delta H_{\text{d}(\text{N}-\text{H})}=390,83\text{ kJ/mol}$$






الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الأول على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (07 نقاط)

- (1) مركب عضوي (A) صيغته المجملة $C_nH_{2n}O$ وكتلته المولية $M=86\text{g.mol}^{-1}$ حيث يتفاعل مع DNPH ولا يتفاعل مع محلول فهلنخ.
- أ- ما طبيعة المركب (A).
- ب- اعط الصيغة نصف مفصلة الممكنة له.

(2) نجري انطلاقاً من المركب (A) التفاعلات التالية:



أ- أعد كتابة معادلات التفاعل السابقة مع توضيح الصيغة نصف مفصلة للمركبات الناتجة.

ب- اقترح سلسلة التفاعلات التي تسمح بتحضير الفينول انطلاقاً من البنزن وكواشف أخرى.

ج- اكتب معادلة تفاعل إرجاع كلمنسن للمركب (A).

د- ما نوع التماكب الفراغي الذي يمتاز به المركب (B) مع التعلييل. مثل متماكبه.

(3) يعتبر المركب H وحدة بنائية لتحضير البوليمر P.

أ- ما نوع البلمرة المؤدية إلى تشكيل البوليمر P؟ وما نوع البوليمر الناتج؟

ب- اعط الصيغة العامة للبوليمر P.

ج- الكتلة المولية المتوسطة للبوليمر (P) تساوي $M=12\text{Kg.mol}^{-1}$. أحسب درجة البلمرة n.

يعطى: $M_H=1\text{g.mol}^{-1}$, $M_O=16\text{g.mol}^{-1}$, $M_C=12\text{g.mol}^{-1}$

التمرين الثاني: (07 نقاط)

I- الجلوتاثيون بببتيد يعمل كمرافق إنزيمي ويعد هام لسلامة خلايا الدم الحمراء وعمل البروتينات، يتكون من ثلاثة أحماض أمينية (A-B-C) حيث:

- A حمض أميني يحتوي على شحتنين سالبيتين في الوسط القاعدي.
- B حمض أميني تسمح جزيئاته بتشكيل رابطة كبريتية في البروتينات.
- C حمض أميني غير فعال ضوئيا.

(1) استنتاج الأحماض الأمينية A , B , C

(2) كيف نسمى الرابطة التي تنشأ عند ارتباط حمضين أمينيين.

pHi	الجزر	المركب	يعطى:
5,07	-CH ₂ -SH	Cys	
5,97	-H	Gly	
3,22	-(CH ₂) ₂ -COOH	Glu	

(3) يعامل الببتيد السابق باستعمال كاشف بيوري وكزانتوبروتيك.


أ- ماهي مكونات كل من بيوري وكزانتوبروتيك.

ب- ماهي النتيجة المنتظر الحصول عليها؟ علل؟

(4) أعط الصيغ الأيونية للحمض الأميني C عند تغير pH من 1 إلى 12 .

(5) نضع مزيج الأحماض الأمينية A ، B ، C في منتصف جهاز الهرجة الكهربائية عند قيمة pH=pHi لأحد

هذه الأحماض الأمينية المكونة للمزيج فتظهر النتيجة كما في الشكل:



أ- تعرف على الأحماض الأمينية المشار إليها بالأرقام، علل؟

ب- اعط تمثيل فيشر للحمض الأميني B.

II- خلال معايرة محلول حمضي لحمض أميني بمحلول من NaOH قمنا بمتابعة تغيرات pH المحلول

باستعمال جهاز pH métre والنتائج مدونة في الجدول التالي:

V _{NaOH} (ml)	0	2	4	6	8	9	10	11	12	13	14
pH	1.7	2	2.2	2.4	2.7	3.4	6.02	8.4	8.9	9.3	9.5
V _{NaOH} (ml)	16	18	20								
pH	9,8	10,2	10,5								

1) ارسم المنحنى $pH = f(V_{NaOH})$

2) عين بيانيا قيمة كل من pH_i و pK_{a_2} و pK_{a_1} .


3) استنتاج من جدول الأحماض الأمينية المعطى اسم الحمض الأميني.

4) أكتب التفاعلات الحاصلة أثناء المعايرة.

5) أكتب الصيغ الأيونية التي يأخذها الحمض الأميني عند $pH = 9.6$ ، $pH_i = 2.34$ ، $pH = pH_i + \log_{10} \frac{V_{NaOH}}{V_{H_3COOH}}$ مع توضيح الصيغ الأيونية السائدة؟

التمرين الثالث: (06 نقاط)

-I- إليك البيان التالي والذي يمثل انتقال مول من غاز مثالي من الحالة الابتدائية (1) إلى الحالة النهائية (2).



1) ما نوع كل من التحولين a و b.

2) احسب العمل W لكل تحول.

3) استنتاج قيمة العمل المنجز من طرف الغاز عند الانتقال من (1) إلى (2).

4) استنتاج كمية الحرارة Q للتحول b.

$$R = 8.314 \text{ J/mol.K}$$

-II- يعطى تفاعل تشكيل حمض الخل CH_3COOH السائل عند 25°C :



1) وازن معادلة التفاعل.

2) احسب أنطالبي المعياري لتشكل حمض الخل السائل $\Delta H_f(\text{CH}_3\text{COOH}_{(l)})$ علماً أن:

$$\Delta H_{\text{vap}}(\text{CH}_3\text{COOH}) = 51.6 \text{ kJ/mol}, \quad \Delta H_{\text{sub}}(\text{C}_{(s)}) = 717 \text{ kJ/mol}$$

يعطى:

الرابطة	C-H	C-O	O=O	O-H	C-C	C=O	H-H
E (kJ/mol)	413	351	498	463	348	810	436

3) أحسب أنطالبي احتراق حمض الخل السائل عند 110°C علماً أن:

$$\Delta H_{\text{comb}}(\text{CH}_3\text{COOH}_{(l)}) = -876 \text{ kJ/mol}, \quad \Delta H_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}) = 44 \text{ kJ/mol} \quad \text{يعطى عند } 25^\circ\text{C}$$

$$T_{eb}(\text{CH}_3\text{COOH}) = 118^\circ\text{C}, \quad T_{eb}(\text{H}_2\text{O}) = 100^\circ\text{C}$$

المركب	$\text{O}_{2(g)}$	$\text{CH}_3\text{COOH}_{(l)}$	$\text{H}_2\text{O}_{(l)}$	$\text{CO}_{2(g)}$	$\text{H}_2\text{O}_{(g)}$
$C_p (\text{J/mol.K})$	29.36	123.1	75.29	37.58	33.58

4) أحسب أنطالبي انصهار حمض الخل الصلب $\Delta H_{\text{fus}}(\text{CH}_3\text{COOH})$




$$\Delta H_f(\text{CH}_3\text{COOH}_{(s)}) = -495.25 \text{ kJ/mol}$$

وتقى الله في شهادة البكالوريا
دامت متألقين

التصحيح النموذجي - الموضوع الأول -

التمرين الأول: (07 نقاط)

-I) إيجاد الصيغة المجملة للمركب X :



-II) الصيغ نصف المفصلة للمركبات المجهولة:

C	B	A	المركب
H ₃ C-C(=O)-CH ₃	H ₃ C-C(=NH)-CH ₃	H ₃ C-C(NH)=CH-MgCl	0,25x7
			الصيغة
J	F	E	D

(2) اسم التفاعل رقم (07): تفاعل أسترة . 0,5

- مردود التفاعل : بما أن الكحول الداخل في التفاعل كحول ثانوي فإن مردوده هو: 60%: 0,25

III- 1) الهدف من إضافة HCl هو : بلورة حمض البنزويك

0,25

- معادلة التفاعل :



2) حساب عدد مولات كل من الكحول البنزيلي وبرمنغنات البوتاسيوم، وتحديد المتفاعلات:

A- الكحول البنزيلي : $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-OH}$

$$n = \frac{m}{M} / M = 7 \times 12 + 8 + 16 = 108 \text{ g/mol} \quad 0,25$$

$$\Rightarrow n = \frac{3.12}{108} = 0.02 \text{ mol} \quad 0,25$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho \cdot V = 1.04 \times 3 = 3.12 \text{ g} \quad 0,25$$

B- برمغنتات البوتاسيوم : KMnO_4

$$n = \frac{m}{M} / M = 4 \times 16 + 39 + 55 = 158 \text{ g/mol} \quad 0,25$$

$$\Rightarrow n = \frac{5}{158} = 0.03 \text{ mol} \quad 0,25$$

- ومنه المتفاعلات المحددة هو: الكحول البنزيلي : $n(\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-OH}) < n(\text{KMnO}_4)$


3) حساب الكتلة التجريبية m_p المتحصل عليها :

لدينا :

$$R = \frac{mp}{mt} \times 100 \quad 0,25$$

حساب الكتلة النظرية m_t :

لدينا:



$$M = 108 \longrightarrow M = 122 \quad 0,25$$

$$m = 3.12 \text{ g} \longrightarrow m_T \quad 0,25$$

$$\Rightarrow m_T = \frac{3.12 \times 122}{108} = 3.52 \text{ g} \quad 0,25$$

ومنه الكتلة التجريبية m_p :


$$R = \frac{mp}{mt} \times 100 \Rightarrow m_p = \frac{R \times mt}{100} = \frac{85.22 \times 3.52}{100} = 3 \text{ g} \quad 0,25$$

التمرين الثاني: (7,5 نقاط)

-I

(1) استنتاج الصيغة نصف المفصلة للمركب A:

0,25



0,25

- رمزه: C₁₆:1Δ⁹

(2) إيجاد الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني B:


بما أن الحمض الدهني B حمض دهني مشبع فإن صيغته من الشكل: C_nH_{2n}O₂

لدينا:

$$\begin{array}{l} 14n+32 \longrightarrow 100\% \\ 12n \quad \longrightarrow 75\% \end{array} \xrightarrow{0,25} \boxed{n=16} \quad \boxed{0,25}$$


ومنه صيغة الحمض الدهني B هي: C₁₆H₃₂O₂

0,25





B:

(3) كتابة الصيغ نصف المفصلة الممكنة لثنائي الغليسيريد:



0,25x3



(4) حساب قرينة اليود I_I وقرينة التصبن لثنائي الغليسيريد DG :

• قرينة اليود I_I:

1mol (DG) → 1mol (I₂)

M (DG) → M (I₂)

100g → I_i

$$I_i = \frac{100 \cdot M_{I_2}}{M_{DG}}$$

- حساب الكتلة المولية لثنائي الغليسيريد:



$$M(DG) = 92 + 254 + 256 - 36$$

$$M_{DG} = 566 \text{ g/mol}$$

0,25


- ومنه قرينة اليود I_I :

$$I_I = \frac{100 \times 254}{566}$$

$$I_I = 44.87$$

0,25

• قرينة التصبن I_S :



$$M(DG) \rightarrow 2 M_{KOH} \times 10^3$$

$$1 \text{ g} \rightarrow I_S$$

$$I_S = \frac{2 M_{KOH} \cdot 10^3}{M_{DG}}$$

- ومنه قرينة التصبن I_S :


$$I_S = \frac{2 \times 56 \times 10^3}{566}$$

$$I_S = 197,87$$

0,25

(5) حساب قرينة التصبن I_S لهذه العينة:

- حساب قرينة الحموضة I_a للحمض الدهني الحر A في العينة:



$$M_{AG} \rightarrow M_{KOH} \times 10^3$$

$$0.2 \text{ g} \rightarrow I_a$$

$$I_a = \frac{0.2 \cdot M_{KOH} \cdot 10^3}{M_{AG}}$$


0,25

$$I_a = \frac{0.2 \times 56 \times 10^3}{254}$$

$$I_a = 44,09$$

0,25

- حساب قرينة الأستر I_e لثنائي الغليسيريد في العينة:



$$M_{DG} \rightarrow 2 M_{KOH} \times 10^3$$

$$0.8 \text{ g} \rightarrow I_e$$

$$I_e = \frac{0.8 \cdot 2 M_{KOH} \cdot 10^3}{M_{DG}}$$

0,25

$$I_e = \frac{0.8 \times 56 \times 10^3}{566}$$

$$I_e = 158,3$$

0,25


- ومنه قرينة التصبن I_S لهذه العينة:

$$I_S = I_a + I_e = 44,09 + 158,3$$

$$I_S = 202,39$$

0,25


1) كتابة الصيغة نصف مفصلة لرباعي البيبتيد:



0,25

- تسميتها: أسبارتيل سيستيئيل الأنيل لизين

2) كتابة الصيغة نصف المفصلة لرباعي البيبتيد عند $\text{pH}=1$:



(3)

أ- تصنيف هذه الأحماض الأمينية: (تحسب اثنان فقط)

0,25x2


- حمض أميني خطى حامضي Asp -

- حمض أميني خطى كبريتى Cys -

- حمض أميني خطى ذو سلسلة كربونية بسيطة Ala -

- حمض أميني خطى أميني (قاعدى) Lys -

ب- كتابة الصيغ الأيونية للحمض الأميني Cys عند تغير ال pH من 1 إلى 13



4) توضيح موقع الأحماض الأمينية Cys, Ala,Lys على شريط الهررة الكهربائية عند $\text{pH}=6$

- حساب الـ pH_i :

$$\text{pH}_{I(\text{Cys})} = \text{pka}_1 + \text{pka}_R / 2 \Rightarrow \text{pH}_{I(\text{cys})} = 5.07$$

$$\text{pH}_{I(\text{Ala})} = \text{pka}_1 + \text{pka}_2 / 2 \Rightarrow \text{pH}_{I(\text{Ala})} = 6$$

$$\text{pH}_{I(\text{Lys})} = \text{pka}_R + \text{pka}_2 / 2 \Rightarrow \text{pH}_{I(\text{Lys})} = 9.7$$

- Ala: لا يهاجر ويبقى في الوسط لأن $\text{pH}_i = \text{pH}$, حيث يكون من الشكل A^{+}

0,75

- Cys يكون على شكل أنيون A^{-} ومنه يهاجر إلى القطب الموجب (+)

- Lys يكون على شكل كاتيون A^{+} ومنه يهاجر إلى القطب السالب (-)

0,25

-

Lys

Ala

Cys

+

التمرين الثالث: (5,5 نقاط)


-I

(1) حساب الحرارة النوعية لانصهار الجليد L_f :

بتطبيق قانون النظام المعزل (المسعر المعزول حراريًا):

$$Q_1 = (m_1 \cdot c_{\text{eau}} + C_{\text{cal}})(T_f - T_1); T_f - T_1 = 287,9 - 308 = -20,1 \text{ K}$$

بالنسبة للجليد ينصهر عند الصفر المئوي T_f ثم ترتفع درجة حرارته من 0°C إلى درجة حرارة التوازن T_f بـ



$$Q_f = m_2 L_f$$

$$Q_2 = m_2 \cdot c_{\text{eau}} \cdot (T_f - T_2); T_f - T_2 = 287,9 - 273 = 14,9 \text{ K}$$

$$Q_1 + Q_f + Q_2 = 0 \Rightarrow (m_1 \cdot c_{\text{eau}} + C_{\text{cal}})(T_f - T_1) + m_2 L_f + m_2 \cdot c_{\text{eau}} \cdot (T_f - T_2) = 0$$

$$L_f = \frac{-(m_1 c_{\text{eau}} + C_{\text{cal}})(T_f - T_1) - m_2 c_{\text{eau}}(T_f - T_2)}{m_2}$$

$$L_f = \frac{-(200 \times 4,185 + 150) \times (-20,1) - 50 \times 4,185 \times 14,9}{50} \rightarrow L_f \approx 334,42 \text{ J/g}$$

0,75

0,25

(2) حساب الحرارة المولية لانصهار الجليد ΔH_{fus} :

$\Delta H_{\text{fus}} \rightarrow 1 \text{ mol}$	$0,25$	$\Delta H = \frac{m L_f}{n}$
$Q_f = m L_f \rightarrow n$		$n = \frac{m}{M}$
		$\Delta H = M \cdot L_f$
		$0,25$
		$\Delta H_{\text{fus}} = 6019,56 \text{ J/g}$
		$0,25$

-II

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho \cdot V \Rightarrow m = 1,0045 \times 3,2$$

$$\Rightarrow m = 3,0135 \text{ g}$$

$$M = 2M_N + 4M_H$$

$$M = 2 \cdot 14 + 4 \cdot 1 \Rightarrow M = 32 \text{ g/mol}$$

(1) حساب كمية مادة الهيدرازين $\text{N}_2\text{H}_{4(1)}$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{3,01325}{32} \Rightarrow n = 0,1 \text{ mol}$$

0,25

(2) استنتاج أنطالبي تفاعل الاحتراق:

$$\Delta H_{\text{comb}} \rightarrow 1 \text{ mol}$$

0,25

0,25


$$\Delta H_{\text{comb}} = \frac{Q_R}{n} = \frac{62,22}{0,1}$$

$$\Delta H_{\text{comb}} = 622,2 \text{ kJ/mol}$$

0,25

(1) حساب ΔH_R :

بضرب المعادلة (3) في (1-)



0,25

وتطبيق قانون هس:

$$\Delta H_R = \Delta H_1 + \Delta H_2 - \Delta H_3 \Rightarrow \Delta H_R = -37 - 92 + 65 \Rightarrow \Delta H_R = -64 \text{ kJ/mol}$$


0,25

استنتاج أنطابلي تشكل النشادر : $\text{NH}_{3(g)}$

(2) من المعادلة (2):

$$\Delta H_f(\text{NH}_{3(g)}) = \frac{\Delta H_2}{2} \Rightarrow \Delta H_f(\text{NH}_{3(g)}) = \frac{-92}{2} \Rightarrow \Delta H_f(\text{NH}_{3(g)}) = -46 \text{ kJ/mol}$$

0,5

(3) التأكد من قيمة $\Delta H_f(\text{NH}_{3(g)})$ باستخدام مخطط التشكيل:

1

$$\Delta H_f(\text{NH}_{3(g)}) = \frac{1}{2}\Delta H_d(\text{N} \equiv \text{N}) + \frac{3}{2}\Delta H_d(\text{H}-\text{H}) - 3\Delta H_d(\text{N}-\text{H})$$

0,25

$$\Delta H_f(\text{NH}_{3(g)}) = \frac{1}{2} \times 945 + \frac{3}{2} \times 436 - 3 \times 390,83 \Rightarrow \Delta H_f(\text{NH}_{3(g)}) = -46 \text{ kJ/mol}$$

0,25

هذه القيمة تتوافق مع النتيجة المحسوبة سابقا.

التصحيح النموذجي -الموضوع الثاني-

التمرين الأول: (07 نقاط)

(1)

أ- طبيعة المركب (A): المركب (A) سيتون لأنه لا يتفاعل مع محلول فهانغ 0,25

ب- الصيغة العامة للسيتونات 0,25




علما ان الصيغة العامة للسيتونات $C_nH_{2n}O$

$$M_A = 12n + 2n + 16 \Rightarrow M_A = 14n + 16 \Rightarrow n = 5$$

0,25

ومنه الصيغة الجزيئية المجملة للمركب (A) $C_5H_{10}O$:









الصيغة نصف مفصلة الممكنة له:




0,25 x 3

(2)


أ- الصيغة نصف مفصلة للمركبات 0,25 x 8:



ب- سلسلة التفاعلات التي تسمح بتحضير الفينول:



جـ- معادلة تفاعل ارجاع كلمنسن للمركب (A) :




0,25

دـ- نوع التماكب الفراغي الذي يمتاز به المركب (B) مع التعليل

0,25 x 2

المركب (B) يتميز بتماكب ضوئي لاحتوائه على كربون غير متوازن متماكبته الضوئية هي:



0,25 x 2

(3)


أـ- نوع البلمرة الحادثة: بلمرة بالتكلاف

0,25

نوع البوليمير الناتج: بولي استر

0,25

بـ- الصيغة العامة للبوليمير:



0,25

جـ- حساب درجة البلمرة : n

الصيغة المجملة للمونومير هي : $\text{C}_7\text{H}_4\text{O}_2$

$$M_{\text{motif}} = (12 \times 7) + (1 \times 4) + (16 \times 2) = 120 \text{ g/mol}$$

0,25


$$0,25 \quad n = \frac{M_P}{M_n} = \frac{12000}{120} \Rightarrow n = 100 \quad 0,25$$

التمرين الثاني: (07 نقاط)

-I

0,25x3

: C ، B ، A ،



(2) الرابطة التي تنشأ عند ارتباط حمضين أمينيين هي: الرابطة البتيدية

(3)

0,25x2


أـ- مكونات كاشف بيوري : NaOH ، CuSO_4

مكونات كزانتوبروتيك : NH_4OH , HNO_3


- ب-

- تفاعل بيوري مع ببتيدي الجلوتاثيون يعطي نتيجة إيجابية وهي لون بنفسجي دلالة على أن الببتيدي يحتوي على روابط ببتيدية. 0,25
- تفاعل كزانتوبروتيك مع ببتيدي الجلوتاثيون يعطي نتيجة سلبية دلالة على أن الببتيدي لا يحتوي على أحماض أمينية عطرية. 0,25

4) الصيغ الأيونية للحمض الأميني Gly عند تغير pH من 1 إلى 12



أ-




التعليق :

$\text{pH} > \text{pHi}$: الحمض الأميني على شكل أنيون A^- أي يتوجه نحو القطب الموجب.

0,25x3 $\text{pH} = \text{pHi}$: Cys

$\text{pH} < \text{pHi}$: الحمض الأميني على شكل كاتيون A^+ أي يتوجه نحو القطب السالب.

ب- تمثيل فيشر لـ Cys




0,25x2

L

D

-II

1) رسم المنحنى $\text{pH} = f(V_{\text{NaOH}})$




(2) تحديد قيمة الـ pH_i ، pK_{a_1} ، pK_{a_2} ببيانيا

- من البيان نجد أن : $pK_{a_2}=9.6$ ، $pK_{a_1}=2.3$ ، $pH_i=5.9$

(3) من جدول الأحماض الأمينية المعطى نستنتج أن الحمض الأميني الذي تمت معايرته هو الغليسين Gly


(4) التفاعلات الحاصلة أثناء المعايرة:



0,25x2


(5) الصيغ الأيونية التي يأخذها الحمض الأميني Gly :

عند $\text{pH}=2.3$: الثنائيّة الموجودة هي Zwitterion بنسبيّة متساوية 50% Cation و




0,25x2

عند $\text{pH}=\text{pH}_i$: لدينا أيون ثنائي القطب Zwitterion



0,25

عند $\text{pH}=9.6$: الثنائيّة الموجودة هي Anion Zwitterion بنسبيّة متساوية 50% Anion و



0,25x2

التمرين الثالث: (06 نقاط)

-I

(1) نوع كل من التحويلين:

(a): تحول عند ضغط ثابت - 0,25

(b): تحول عند درجة حرارة ثابتة - 0,25

(2) حساب العمل لكل تحول:

عند ضغط ثابت

$$W_a = -P\Delta V = -P(V_2 - V_1) \quad V_1 = nRT_1/P \quad \text{و} \quad V_2 = nRT_2/P \quad 0,25$$

$$\begin{aligned} W_a &= -P(nRT_2/P - nRT_1/P) \\ &= -P \cdot nRT / P(T_2 - T_1) \\ &= -nRT(T_2 - T_1) = -1 \cdot 8.314(546 - 273) \\ &= -2269.7 \text{ J} \end{aligned} \quad 0,25$$

عند درجة حرارة ثابتة

$$W_b = -nRT \cdot \ln(P_1/P_2) \quad 0,25$$

$$\begin{aligned} W_b &= -nRT \cdot \ln(1/2) \\ &= -1 \cdot 8.314 \cdot 546 \cdot \ln(1/2) \\ &= 3146.5 \text{ J} \end{aligned} \quad 0,25$$


(3) استنتاج العمل الكلي:

$$W_T = W_a + W_b = -2269.7 + 3146.5 = 876.8 \text{ J} \quad 0,25$$


0,5 (4) استنتاج قيمة كمية الحرارة Q لتحول b : $\Delta U = Q + W = 0$ ومنه $Q = -W = -3146.5 \text{ J}$

-II

(1) موازنة المعادلة:



(2) حساب أنطالبي تشكيل حمض الخل ($\Delta H_f(CH_3COOH_{(l)})$)




$$\Delta H_f(CH_3COOH_{(l)}) = 2\Delta H_{\text{Sub}}(C_{(s)}) + 2E_{(H-H)} + E_{(O=O)} - 3E_{(C-H)} - E_{(C-O)} - E_{(C-C)} - E_{(C=O)} - E_{(O-H)} - \Delta H_{\text{Vap}}(CH_3COOH_{(l)})$$

$$= 2(717) + 2(436) + 498 - 3(413) - 348 - 810 - 351 - 463 - 51.6 \quad 0,25$$

$$= -458.6 \text{ kJ/mol} \quad 0,25$$

(3) حساب أنطالبي احتراق حمض الخل السائل عند 110°C :



$$0,5 \quad \Delta H_{383} = \Delta H^\circ_{298} + \int_{298}^{373} \Delta C_{P1} + \int_{373}^{383} \Delta C_{P1} + \Delta H_{\text{Vap}}(\text{H}_2\text{O}_{(l)}) \\ = \Delta H^\circ_{298} + \Delta C_{P1} (373-298) + \Delta C_{P2} (383-373) + \Delta H_{\text{Vap}}(\text{H}_2\text{O}_{(l)})$$

$$0,25 = -876 + \Delta C_{P1} (373-298) + \Delta C_{P2} (383-373) + 44$$


$$0,25 \quad \Delta C_{P1} = \sum C_P (\text{المتفاعلات}) - \sum C_P (\text{النواتج}) \\ = 2C_P(\text{CO}_{2(g)}) + 2C_P(\text{H}_2\text{O}_{(l)}) - C_P(\text{CH}_3\text{COOH}_{(l)}) - 2C_P(\text{O}_{2(g)}) \\ = 2(37.58) + 2(75.29) * 10^{-3} - 123.1 - 2(29.36) \\ = 43.92 \text{ J/mol.K}$$

$$\Delta C_{P2} = \sum C_P (\text{النواتج}) - \sum C_P (\text{المتفاعلات}) \\ = 2C_P(\text{CO}_{2(g)}) + 2C_P(\text{H}_2\text{O}_{(g)}) - C_P(\text{CH}_3\text{COOH}_{(l)}) - 2C_P(\text{O}_{2(g)}) \\ = 2(37.58) + 2(33.58) - 123.1 - 2(29.36) \\ = -39.5 \text{ J/mol.K}$$

$$\Delta H_{383} = -876 + 43.92 (373-298) * 10^{-3} - 39.5 (383-373) * 10^{-3} + 44 = -832.06 \text{ kJ/mol}$$

$$0,25 \quad \Delta H_{383} = -832.06 \text{ kJ/mol}$$

(4) حساب انطالبي انصهار حمض الخل (CH_3COOH)



$$\Delta H_{\text{Sub}}(\text{CH}_3\text{COOH}) = \Delta H_f(\text{CH}_3\text{COOH}_{(l)}) - \Delta H_f(\text{CH}_3\text{COOH}_{(s)}) = -458.6 - (-495.25) \quad 0,25$$

$$\Delta H_{\text{Sub}}(\text{CH}_3\text{COOH}) = -36.65 \text{ kJ/mol} \quad 0,25$$