

الموضوع التدريسي رقم 01 : بكالوريا علوم تجريبية 2025

التمرين رقم 01 : "المتتاليات العددية"

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n , $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 1$

1) برهن بالترابع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n , $u_n < 3$.

2) بين أن (u_n) متزايدة تماما.

3) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على \mathbb{N} بـ: $v_n = u_n - 3$

أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ يطلب تعين حذها الأول v_0

ب) عين عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثم استنتج أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ,

ج) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

4) نضع: من أجل كل عدد طبيعي n , $T_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ و $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$

احسب S_n بدلالة n ثم بين أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ,

التمرين رقم 02 : "الاحتمالات"

كييس يحوي 10 كريات لا فرق بينها باللمس منها 3 كريات بيضاء، 6 كريات حمراء وواحدة خضراء. نرمز للكريمة البيضاء بالرمز B , وللكريمة الحمراء بالرمز R وللخضراء بالرمز V

I) نسحب من الكيس على التوالي كرتين دون إرجاع. ونعتبر الحادثتين:

" A " الحصول على كريمة بيضاء في السحب الثاني" و " C " الحصول على كريمة حمراء في السحب الأول".

1- شكل شجرة الاحتمالات لهذه التجربة

2- احسب $P(A \cap C)$, $P(A)$ و $P(C)$.

3- احسب $P(C)$, واستنتج هل الحادثتين A و C مستقلتين؟


II) سحب من الكيس عشوائيا وفي آن واحد كرتين.

X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات البيضاء المسحوبة.

1- عرف قانون احتمال X , واحسب الأمل الرياضي ($E(X)$).

2- احسب $P(X^2 - 4X = 0)$

Instagram



@XPI4MATH

التمرين رقم 03 : "الأعداد المركبة"

1- حل في \mathbb{C} المعادلة: $(z - 1 + i)(z^2 + 2z + 4) = 0$

نعتبر في المستوى المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ النقط A , B و C لواحقها على الترتيب i , $z_C = \overline{z_B}$, $z_B = -1 + i\sqrt{3}$, $z_A = -1 + i$ و

2- أكتب على الشكل الأسني كل من الأعداد: z_A , z_B و z_C

3- أكتب $\frac{z_A}{z_B}$ على الشكل الجيري ثم الشكل المثلثي، استنتج القيمة المضبوطة لـ

$$\left(\frac{z_B}{2}\right)^{2023} + \left(\frac{z_C}{2}\right)^{1444} = -1$$

التمرين رقم 04 : "الدالة الأسية"

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$g(x)$	-1	$g\left(-\frac{1}{2}\right)$	$+\infty$

I) الجدول المقابل يمثل تغيرات الدالة g المعرفة على \mathbb{R} بـ:

$$g(x) = -1 + (2x - 1)e^x$$

أثبت أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدا α حيث $0,7 < \alpha < 0,8$

II) استنتاج حسب قيمة x إشارة $g(x)$ على \mathbb{R}

$$f(x) = -x + 4 + (2x - 3)e^x \text{ على } \mathbb{R} \text{ بـ:}$$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

$$(1) \text{ احسب } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ ثم بين أن: } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

ب) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x + 4$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$

ج) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)

$$(2) \text{ أ) بين أنه: من أجل كل عدد حقيقي } x, (f'(x) = g(x))$$

ب) استنتاج أن f متفاصلة تماما على $[\alpha; -\infty]$ ومتزايدة تماما على $[\alpha; +\infty]$ ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) أثبت أن (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي (Δ) يُطلب تعين معادلة له.

$$\text{ب) ارسم } (\Delta), (C_f) \text{ و } (T) \text{ (نأخذ: } f(2) \approx 9,4 \text{ و } f(\alpha) \approx 0,1 \text{)}$$

ج) عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = -x + m$ حلين بالضبط.

$$(4) F \text{ الدالة المعرفة على } \mathbb{R} \text{ بـ: } F(x) = (-2x + 5)e^x$$

أ) تحقق أن F أصلية للدالة $x \mapsto (-2x + 3)e^x$ على \mathbb{R}

ب) استنتاج مساحة الحيز المستوى المحدود بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها

$$x = 0, x = -1, y = -x + 4$$

Instagram



الموضوع التدريسيي رقم 02 : بكالوريا علوم تجريبية

◀ التمرين الأول: 03.00

في كل حالة من الحالات الثلاث الآتية، أجب ب الصحيح أو خطأ مع التبرير بدقة

$$(S): \begin{cases} 2z_1 - z_2 = -3 \\ 2\bar{z}_1 + \bar{z}_2 = -3 - 2i\sqrt{3} \end{cases} \quad \text{نعتبر الجملة } z_1 \text{ و } z_2 \text{ عدداً مركباً مع } \bar{z}_1 \text{ مراافق } z_1 \text{ و } \bar{z}_2 \text{ مراافق } z_2.$$

1 [01.00]

• العددان المركبان حلّي الجملة (S)، هما: $(z_1; z_2) \in \{(-3 + \sqrt{3}i; \sqrt{3}i), (-3 - \sqrt{3}i; -\sqrt{3}i)\}$

$$A = \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^{1444} + \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^{2023} \quad \text{نعتبر العدد المركب } A, \text{ حيث:}$$

2 [01.00]

• العدد A حقيقي

3 [01.00] نعتبر في المستوى المركب $(0; \vec{v}; \vec{u})$ النقطة A ذات اللاحقة $i - 2i$ ذات اللاحقة $\sqrt{3} + i$ التي تتحقق: $|z_A - 2 - 4i| = |\sqrt{3} + i - 2 - 4i|$ هي:

• الدائرة ذات المركز A ونصف القطر 1

◀ التمرين الثاني: 05.00

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بحدتها الأول $u_0 = \frac{3}{2}$ ومن أجل كل $n \in \mathbb{N}$ بـ:

1 [00.75] برهن بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي n لدينا: $u_n > 0$

2 [00.75] ادرس اتجاه تغير (u_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة

3 [00.50] أ/ بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n لدينا: $0 < u_{n+1} < \frac{2}{5}u_n$

ب/ استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) = 0$

4 [00.50] $v_n = \frac{4u_n}{2u_n + 3}$ (متتالية معرفة على \mathbb{N} كما يلي:)

ب/ بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{2}{5}$

ج/ اكتب بدلالة n عبارة v_n و u_n

د/ احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n)$ بطريقة أخرى

5 [00.50] عيّن بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{6}{2u_0 + 3} + \frac{6}{2u_1 + 3} + \dots + \frac{6}{2u_n + 3}$



◀ التمرين الثالث: 04.25

يراد تشكيل فرقة استكشاف للبرية تضم 3 أعضاء منهم قائد ومسعف ومقتفي أثر، من بين 4 رجال F_1, F_2, F_3, F_4 و 3 نساء H_1, H_2, H_3 ، حيث:

1 احسب احتمال كل من الحوادث التالية:

A: "كل أعضاء الفرقة رجال"

B: "الفرقة تضم على الأكثرب امرأة"

C: " هو المسعف في هذه الفرقة"

$$2 \text{ بين أن } P(B \cap C) = \frac{1}{5} [00.75]$$

3 نعتبر المتغير العشوائي الذي يرفق بكل فرقة بحث عدد الرجال فيها

A/ عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X [01.00]

B/ احسب احتمال الحدث: " $X < X^2$ " [00.50]

C/ احسب $E(X)$ الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X [00.50]

◀ التمرين الرابع: 07.75

المستوى المنسوب إلى المعلم المعتمد المتتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث: $\|\vec{i}\| = 1\text{cm}$ و $\|\vec{j}\| = 2\text{cm}$

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $[0; +\infty)$ بـ (C_g) تمثيلها البياني [01.25]

1 ادرس تغيرات الدالة g على المجال $[0; +\infty)$ ، ثم شكل جدول تغيراتها [00.25]

2 بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدا α يحقق $1.8 < \alpha < 1.9$ [00.25]

3 استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $[0; +\infty)$ [00.25]

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $[0; +\infty)$ بـ (C_f) تمثيلها البياني [01.00]

1 احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا [01.00]

2 أ/ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $[0; +\infty)$ ، $f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2+1)^2}$ [00.50]

ب/ استنتاج اتجاه تغير الدالة f على $[0; +\infty)$ ، ثم شكل جدول تغيراتها [00.50]

3 بين أن $f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha^2}$ ، ثم استنتاج حصراً $f(\alpha)$ سعته 10^{-2} [00.75]

4 عين إحداثي تقاطع (C_f) مع محور الفواصل، ثم مثل المنحنى (C_f) [01.25]

III) G الدالة العددية المعرفة على $[0; +\infty)$ بـ $G(x) = \int_1^x g(t) dt$ [01.00]

1 باستعمال المتكاملة بالتجزئة، بين أن الدالة $H: x \mapsto \frac{x^3}{3} \left(\ln x - \frac{1}{3} \right)$ دالة أصلية للدالة $h: x \mapsto x^2 \ln x$ [01.00]

2 عين عبارة $G(x)$ على المجال $[0; +\infty)$ [00.50]

3 احسب بدلالة α العدد A_α مساحة الحيز المستوى المحدود بـ (C_g) ومحور الفواصل [00.50]

والمستقيمان الذين معدلتاهما 1 $x = \alpha$ و $x = 1$ [00.50]

Instagram



@XPI4MATH

الاستاذ بوكحول كمال
WhatsApp business account



الاستاذ بوكحول كمال

الموضوع التدريسي رقم 03 : بكالوريا علوم تجريبية

التمرين 01 : "الأعداد المركبة"

I. حل في C المعادلة ذات المجهول z التالية : $(z+2)(z^2+2z+4)(z^2+6z+12) = 0$
 نعتبر في المستوى المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}; \vec{v})$, النقط D, C, B, A و E .
 بحيث : $Z_D = \overline{Z_B}$ ، $Z_B = -1 + i\sqrt{3}$ ، $Z_A = \overline{Z_D}$ ، $Z_E = -2$.

1. أحسب كلا من : $|Z_B + 2|$ ، $|Z_C + 2|$ ، $|Z_E - Z_A|$ ثم إستنتج أن النقط الأربع D, C, B و E تنتهي إلى نفس الدائرة يطلب تعين مركزها وطول نصف قطرها.

2. اكتب كلا من Z_A و Z_B على الشكل الأسني. ثم تحقق أن $-3 - i\sqrt{3} = Z_D$

3. بين أن العدد $\left(\frac{Z_A}{2}\right)^{2022} + \left(\frac{Z_B}{2}\right)^{2022}$ حقيقي موجب.

5. لتكن النقطة K بحيث $Z_k = -Z_C$ أثبت أن النقط O, K و C في إستقامية.

6. أحسب $\frac{Z_K - Z_B}{Z_C - Z_B}$ ثم إستنتاج طبيعة المثلث KBC

التمرين 02 : "الاحتمالات"

يحتوي كيس على 4 كريات خضراء مرقة بـ $-1; 0; 1$ و 3 كريات حمراء مرقة بـ $0; 0; 1$ وكريتين يضاوين مرقتين بـ $-1; 0$ كل الكرات متتجانسة لانفرق بينها باللمس. نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كرات من هذا الكيس.

1. أحسب إحتمال الحوادث التالية:

A : الحصول على كرات من نفس اللون . B : الحصول على كرات مجموع ارقامها يساوي 0.
 C : الحصول على 3 كرات تشكل العلم الوطني الجزائري.

2. بين أن $P(A \cap B) = \frac{1}{42}$. هل الحدثان A و B مستقلان؟ برر جوابك.

3. إذا كان مجموع الأرقام يساوي 0. ما إحتمال أن تكون الكرات من نفس اللون؟.

4. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب مجموع أرقام الكرات المسحوبة.

((ا)) اثبت أن : $\{3; 2; 1; 0; -1; -2\} = X$ ثم عرف قانون الإحتمال X .



التمرين 03 : "المتتاليات العددية "

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ : $u_0 = 13$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5}$

(1) أ) برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > 1$.

ب) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) واستنتج أنها متقاربة.

(2) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على \mathbb{N} بـ : $v_n = \ln(u_n - 1)$.

أثبت أنَّ المتتالية (v_n) حسابية يطلب تعين أساسها وحدتها الأولى.

(3) اكتب v_n بدلالة n ثم بين أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 1 + \frac{12}{5^n}$ واحسب عندئذ $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(4) بين أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $(u_0 - 1)(u_1 - 1) \times \dots \times (u_n - 1) = \left(\frac{12}{5^2}\right)^{n+1}$

التمرين 04 : "الدالة اللوغاريتمية و الحساب التكاملی "

f الدالة العددية المعرفة على $[0; 2] \cup [2; +\infty]$ بـ : $f(x) = \frac{1}{x-2} + \ln x$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \bar{i}, \bar{j})$.

(1) أ) احسب $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ثم فسِّر النتائج بيانيًا.

ب) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

(2) ادرس اتجاه تغير الدالة f على $[0; 2] \cup [2; +\infty]$ وشكِّل جدول تغييراتها.

(3) نسمي (Γ) المنحنى البياني للدالة اللوغاريتمية التبيرية "ln" في المعلم السابق.

أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \ln x)$ ثم فسِّر النتيجة بيانيًا.

ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المنحنى (Γ).

(4) ارسم بعناية المنحنى (Γ) ثمَّ المنحنى (C_f).

(5) H الدالة المعرفة على المجال $[3; +\infty]$ بـ : $H(x) = \int_3^x \ln(t) dt$ حيث t متغير حقيقي موجب تماماً.

أ) باستعمال المتكاملة بالتجزئة، عِين عبارة $H(x)$ بدلالة x .

ب) احسب \mathcal{A} مساحة الحيز المستوى المحدود بالمنحنى (C_f) وحاملي محور الفواصل

وال المستقيمين ذوي المعادلتين : $x = 3$ و $x = 4$.



الموضوع التدريسي رقم 04 : بكالوريا علوم تجريبية


التمرين 01 : "الأعداد المركبة"

- (1) نعتبر كثير الحدود $P(z) = z^3 - 3z^2 + 3z + 7$ حيث $z \in \mathbb{C}$ للمتغير المركب Z .
 أ) بين أنه إذا كان Z_0 حل للمعادلة $P(z) = 0$ ، فإن $\overline{Z_0}$ حل لها أيضاً $(\overline{Z_0}$ مرافق $Z_0)$.
- (b) أحسب $P(-1)$ ، ثم بين أنه من أجل كل $Z \in \mathbb{C}$ من \mathbb{C} حل في \mathbb{C} المعادلة $P(z) = 0$.
 حيث a و b عداد حقيقيان يطلب تعبيئهما. (ج) حل في \mathbb{C} المعادلة $P(z) = 0$.
- (2) معلم متعامد ومتجانس للمستوى المركب $(O; \vec{u}; \vec{v})$.
 نعتبر النقط A ، B و C والتي لواحقها على الترتيب $Z_A = 2 - i\sqrt{3}$ ، $Z_B = 2 + i\sqrt{3}$ ، $Z_C = -1$.
 أ) أحسب $|Z_B - Z_A|$ ، $|Z_C - Z_A|$ ، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .
 ب) عين Z_G لاحقة النقطة G مرجح الجملة: $\{(A; -1), (B; 2), (C; 2)\}$.
- (ج) أحسب طولية وعمدة للعدد المركب $L = \frac{Z_A - Z_C}{Z_G - Z_C}$ ، ثم أكتب L على الشكل الأسني .
 د) استنتاج طبيعة المثلث GAC .
 هـ) بين أن L^{2019} تخيلي صرف .
 و) عين قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها العدد L^n حقيقيا.

التمرين 02 : "المتتاليات"

- f الدالة المعرفة على $[0; +\infty)$ بـ: $f(x) = \frac{6x+5}{x+2}$ ، وليكن (C_f) المنحني الممثل لها في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ، (Δ) هو المستقيم ذو المعادلة $x = y$ (أنظر الشكل).
- I) تتحقق أن الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[0; +\infty)$.
 II) متتالية معرفة بحدها الأول $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = f(u_n)$.
 1) أنقل الشكل المقابل ثم مثل على محور الفواصل الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 .
 ب) ضع تخمينا حول إتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.
 2) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \leq 5$.
 3) أدرس إتجاه تغير المتتالية (u_n) ، هل هي متقاربة؟
 4) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = \frac{u_n - 5}{u_n + 1}$.
 أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعبيئ أساسها وحدتها الأول .
 ب) عبر عن v_n ثم عن u_n بدلالة n . ج) ما هي نهاية المتتالية (u_n) ؟

5) أحسب المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{1}{u_0 + 1} + \frac{1}{u_1 + 1} + \dots + \frac{1}{u_n + 1}$



التمرين 03 : "الاحتمالات"

قسم للثلاثة تقني رياضيتي به 18 تلميذاً موزعين على أربع تخصصات كما يلي: 6 تلاميذ هندسة كهربائية منهم 4 ذكور ، 5 تلاميذ هندسة ميكانيكية منهم 3 ذكور ، 4 تلاميذ هندسة مدنية كلهم ذكور و 3 تلاميذ هندسة الطرائق كلهم إناث .

I/ نريد تشكيل لجنة تضم 4 تلاميذ من هذا القسم بطريقة عشوائية .

1) احسب إحتمال كل من الحدين التاليين :

"A" اللجنة تضم تلاميذاً من نفس الجنس "B" تلاميذ اللجنة من نفس الجنس "

2) بين أن $P(A \cap B) = \frac{1}{1530}$ ، واستنتج إحتمال أن تضم اللجنة تلاميذاً من نفس التخصص أو من نفس الجنس .

II/ نريد الآن وبطريقة عشوائية تعين تلميذين من هذا القسم أحدهم رئيس والآخر نائب .

نعتبر X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل لجنة عدد تلاميذ الهندسة الكهربائية فيها .

1) برهن أن القيم الممكنة لـ X هي {0;1;2} ثم عرض قانون إحتمال X .

2) احسب $E(X)$ الأمل الرياضي لـ X ثم عين قيمة العدد الحقيقي α بحيث يكون: $E(2025X + \alpha) = 2024$

التمرين 04 : "الدالة الأسية و الحساب التكاملی"

I. g الدالة العددية المعرفة على \mathbb{R} بـ $g(x) = 2 + (x - 2)e^{-x+2}$

1) ادرس تغيرات الدالة g .

2) بين ان المعادلة $0 = g(x)$ تقبل حل واحداً α حيث $1.14 < \alpha < 1.15$.

3) استنتج اشارة g(x) حسب قيمة x .

II. لتكن الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} بـ $f(x) = 2x - 1 - (x - 1)e^{-x+2}$ التمثيل البياني للدالة في المعلم

المتعامد المتجانس $(O; \bar{i}; \bar{j})$ حيث $\|\bar{i}\| = 2\text{cm}; \|\bar{j}\| = 2\text{cm}$

1) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ج-بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = g(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f

د-بين أن $f(\alpha) = 2\alpha + 1 + \frac{2}{\alpha - 2}$ ثم استنتج حصراً للعدد $f(\alpha)$

2) أثبتت ان المنحنى (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) معادلته: $y = 2x - 1$

ب-ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

ج-بين ان المنحنى (C_f) يقبل مماساً (T) يوازي (Δ) يتطلب اعطاء معادلة ديكارتية له .

ب-احسب $f(0), f(2)$ ثم ارسم (Δ) و (C_f) .

3) عين بياناً قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة (E) ذات المجهول الحقيقي x التالية حلين متمايزين :

$$(E): 2m - 1 - (x - 1)e^{-x+2} = 0$$

A) عين باستعمال التكامل بالتجزئة الدالة الأصلية H للدالة $H(x) \mapsto (x - 1)e^{-x+2}$ على \mathbb{R} والتي تنعدم عند 0 .

B) ليكن λ عدداً حقيقياً حيث $\lambda > 1$. (λ) مساحة العيّز المستوى المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم

(Δ) والمستقيمات التي معادلاتها: $x = \lambda; x = 1$.

• احسب المساحة $A(\lambda)$ بدلالة λ ثم احسب $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$

الموضوع التدريسي رقم 05 : بكالوريا علوم تجريبية

التمرين 01 : "الأعداد المركبة" 4 ن

I- نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} كثير الحدود $P(z)$ حيث :

$$z^3 - 8 = (z - 2)(z^2 + 2z + 4) \quad 1$$

إستنتج كل حلول المعادلة $0 = P(z) \quad 2$

II- نعتبر في المستوى المركب $(O; \vec{u}, \vec{v})$ النقط A, B, C ذات اللواحق

$$z_C = 2, z_B = \bar{z}_A, z_A = -1 + \sqrt{3}i$$

أكتب z_A, z_B, z_C على الشكل الأسني 1

إستنتج أن النقط A, B, C تنتهي إلى نفس الدائرة (يطلب تعين مركزها ونصف قطرها) 2

بين أن : $z_A^{2023} = 2^{2022}z_A \quad 3$

أكتب العدد المركب $L = \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ على الشكل الجبري ثم الأسني 4

إستنتاج طبيعة المثلث $ABC \quad 5$

التمرين 03 : "المتتاليات العددية" 5 ن

لتكن المتتاليتان (u_n) و (v_n) المعرفتان على \mathbb{N} بـ :

$$u_n = \frac{2^n - 3n + 1}{2}, v_n = \frac{2^n + 3n - 1}{2} \quad 1$$

 أحسب الحدود u_0 و u_1 و u_2 و v_0 ، v_1 ، v_2 ،

لتكن المتتالية (w_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ : $w_n = u_n - v_n \quad 2$

أثبت أن (w_n) متتالية حسابية معينا أساسها وحدها الأول

بـ/ أحسب المجموع $S = w_0 + w_1 + \dots + w_{10} \quad 3$

لتكن المتتالية (t_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ : $t_n = u_n + v_n \quad 4$

أـ/ أثبت أن (t_n) متتالية هندسية معينا أساسها وحدها الأول

بـ/ أحسب المجموع $S' = t_0 + t_1 + \dots + t_{10} \quad 5$

ليكن : $S_2 = v_0 + v_1 + \dots + v_{10}$ ، $S_1 = u_0 + u_1 + \dots + u_{10} \quad 6$

أـ/ تتحقق أن : $S' = S_1 + S_2$ ، $S = S_1 - S_2 \quad 7$

بـ/ إستنتج قيمة كل من S_1 و S_2

Instagram



@XPI4MATH

الأستاذ بوكحول كمال
WhatsApp business account



التمرين 02 : "الاحتمالات" 4 ن

يحتوي كيس على ثلات كريات بيضاء تحمل العدد 0 ، وخمس كريات سوداء تحمل العدد 3 ، وكريتين حمراوتين تحملان العدد α (حيث $\alpha \in \mathbb{N}^*$) ، كل الكريات متماثلة ولا نفرق بينها عند اللمس نسحب عشوائيا كرتين من الكيس في آن واحد

1 أحسب إحتمال الأحداث الآتية : A : "الحصول على كريتين من نفس اللون"

B : "الحصول على كريتين جداء الأعداد المسجلة عليها معدوم" ، C : "سحب كريتين حمراوين على الأكثـر"

2 نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب ، مجموع العددين المسجلين على الكريتين عـرف قانون إحتمال للمتغير العشوائي X

$$E(X) = \frac{2}{5}\alpha - 3 \quad 3$$

4 عـين أصغر قيمة للعدد الطبيعي α حتى يكون $E(X) > 0$

التمرين 04 : "الدالة الأسية والحساب التكاملـي" 7 ن

I- لـتكن الدالة g المعرفة على \mathbb{R} كما يلي : $g(x) = x + e^x$

1 أدرس إتجاه تغير الدالة g

2 عـين أن المعادلة $0 = g(x)$ تقبل حلـا وحـيدـا α حيث : $-0.57 < \alpha < -0.56$

3 اـستـتـجـعـ حـسـبـ قـيمـ العـدـدـ الـحـقـيقـيـ x إـشـارـةـ $g(x)$

II- f هي الدالة المعرفة على \mathbb{R} بالعبارة : $f(x) = xe^{1-x}$ ، (C_f) تمثيلـهاـ الـبـيـانـيـ في مـعـلـمـ $(0; \vec{i}, \vec{j})$

1 أـحـسـبـ نـهـاـيـيـ الدـالـةـ f عـندـ $-\infty$ وعـندـ $+\infty$

2 عـينـ أنـ المـسـتـقـيمـ (Δ) ذـوـ الـمـعـادـلـةـ $x = y$ مـقـارـبـ لـ (C_f) بـجـوارـ $+\infty$ ، ثـمـ أـدـرسـ وـضـعـيـةـ (C_f) بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ (Δ)

3 أـبـيـنـ أـنـهـ مـنـ أـجـلـ كـلـ عـدـدـ حـقـيقـيـ x فـإـنـ : $f'(x) = e^{1-x}g(x-1)$

بـ/ إـسـتـتـجـعـ أـنـ الدـالـةـ f مـتـزاـيـدـةـ تـمـامـاـ عـلـىـ $[+\infty; \alpha+1]$ وـمـتـناـقـصـةـ تـمـامـاـ عـلـىـ $[-\infty; \alpha+1]$

جـ/ شـكـلـ جـدـولـ تـغـيـرـاتـ الدـالـةـ f

4 أـكـتـبـ مـعـادـلـةـ المـمـاسـ (T) لـلـمـنـحـنـيـ (C_f) عـنـ النـقـطـةـ ذاتـ الفـاـصـلـةـ 1

5 أـحـسـبـ $f(-1)$ ، ثـمـ أـنـشـئـ كـلـ مـنـ (T) ، (Δ) وـ (C_f) . (نـأـخـذـ $\alpha = -0.4$)

III- λ عـدـدـ حـقـيقـيـ موـجـبـ تـمـامـاـ

1 يـاستـعـمـالـ التـكـامـلـ بـالـتـجـزـئـةـ عـينـ دـالـةـ أـصـلـيـةـ لـلـدـالـةـ $x \mapsto xe^{1-x}$ عـلـىـ \mathbb{R} وـالـتـيـ تـنـعـدـ عـنـ 0

2 أـحـسـبـ بـدـلـالـةـ λ الـمـسـاحـةـ $A(\lambda)$ لـلـحـيزـ الـمـسـتوـيـ المـحـدـدـ بـ (C_f) وـ الـمـسـتـقـيمـ (Δ) وـ الـمـسـتـقـيمـينـ الـذـيـنـ

$$x = \lambda \text{ و } x = 0 \text{ معـادـلـتـيـمـاـ}$$

Instagram



@XPI4MATH

الموضوع التدريسي رقم 06 : بكالوريا علوم تجريبية

التمرين 01 : "الأعداد المركبة" 4 ن

- 1) $P(z) = z^3 - 3z^2 + 3z + 7$ حيث :
 أ) احسب $P(-1)$ ، ثم عين العددان الحقيقيين a و b حتى يكون :
 ب) حل في \mathbb{C} المعادلة $P(z) = 0$.

2- في المستوى المنسوب إلى معلم متواحد متتجانس (o, \bar{i}, \bar{j}) نعتبر النقط A, B, C و G لواحقها على الترتيب

$$z_A = -1, z_B = 2 + i\sqrt{3}, z_C = 2 - i\sqrt{3} \text{ و } z_G = 3$$

- أ) عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون " $z_B - z_A$ " عدداً حقيقياً سالباً.
 ب) احسب الأطوال AB, AC و BC ، ثم عين طبيعة المثلث ABC .

- 3- أ) أكتب $\frac{z_A - z_C}{z_G - z_C}$ على الشكل الأسوي ، ثم استنتج أن A صورة G بتحويل نقطي يطلب تعينه.

ب) جد مركز و نصف قطر الدائرة المحيطة بالمثلث ACG .

- 4- أ) بين أن النقطة G مرجل الجملة $\{(A, -1), (B, 2), (C, 2)\}$.

- ب) عين مجموعة النقط M من المستوى M حيث :

التمرين 03 : "المتتاليات العددية" 5 ن

المتتالية العددية (u_n) معرفة بـ: $u_0 = 3 + e^{-2}$ و $u_n = u_{n-1}^2 - 6u_{n-1} + 12$ من أجل كل عدد طبيعي n ،

$$u_{n+1} = (u_n - 3)^2 + 3 \text{ ، } n \in \mathbb{N}$$

أ. تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $3 < u_n < 4$

ب. برهن بالترافق أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، u_n متقاربة.

أ. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n)

ب. استنتاج أن (u_n) متقاربة.

3) المتتالية العددية (v_n) معرفة على \mathbb{N} بـ: $v_n = \ln(u_n - 3)$

أ. بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2 يطلب حساب حدها الأول.

ب. اكتب v_n بدلالة n ثم استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي n ،

ج. احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

4) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $P_n = (u_0 - 3)(u_1 - 3) \times \dots \times (u_n - 3)$

احسب P_n بدلالة n



التمرين 02 : "الاحتمالات" 4 ن

توجد إجابة صحيحة واحدة من بين الأوجبة المقترحة في كل حالة من الحالات التالية. اختر الإجابة الصحيحة مبرراً اختيارك.

يحتوي كيس على ثلاثة كريات بيضاء تحمل الأرقام 1، 2، 3 و كريتين سوداين تحملان الرقمين 1، 2.

(الكريات لا تفرق بينها عند اللمس)

سحب من الكيس 3 كريات عشوائية وفي آن واحد.

X المتغير العشوائي الذي يرافق بكل سحب عدد الكريات السوداء المسحوبة.

$$(1) \text{ قيم المتغير العشوائي } X \text{ هي: } \{0;1;2\}$$

$$(2) \text{ الأمل الرياضي } E(X) \text{ لـ } X \text{ هو: } \frac{4}{5}$$

(3) احتمال الحصول على كرتين سوداء واحدة تحمل رقم 1 من الكريات المسحوبة.

$$\begin{array}{lll} \text{يساوي: } \frac{3}{5} & \text{يساوي: } \frac{9}{10} & \text{يساوي: } \frac{7}{10} \\ \text{بـ } \frac{3}{5} & \text{بـ } \frac{9}{10} & \text{بـ } \frac{7}{10} \end{array}$$

(4) احتمال باقي قسمة مجموع مربعات الأرقام التي تحملها الكريات المسحوبة على 13 هو 1.

$$\begin{array}{lll} \text{يساوي: } \frac{1}{5} & \text{يساوي: } \frac{3}{10} & \text{يساوي: } \frac{2}{5} \\ \text{بـ } \frac{1}{5} & \text{بـ } \frac{3}{10} & \text{بـ } \frac{2}{5} \end{array}$$

Instagram



@XPI4MATH

الاستاذ بوكحول كمال
WhatsApp business account



التمرين 04 : "الدالة الأسية والحساب التكاملية" 7 ن

(I) الدالة العددية g معرفة على \mathbb{R} كمايلي :

(1) أ) عين نهاية الدالة g

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.

(2) احسب $g(0)$ واستنتج إشارة $g(x)$ على \mathbb{R}

(II) دالة العددية معرفة على \mathbb{R} بـ:

نرمز (C_r) لتمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتاجنس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) عين نهاية الدالة f عند $+\infty$ و عند $-\infty$

(2) بين أن (C_r) يقبل مستقيماً مقارياً مائلاً (Δ) يطلب تعين معادلة له.

(3) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

(4) بين أن (C_r) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتا هما α و β حيث $-3 < \alpha < -3,5$ و $0,5 < \beta < 1$

(5) ارسم (Δ) و (C_r)

(6) أ) باستعمال المتكاملة بالتجزئة ، عين الدالة الأساسية للدالة $x \rightarrow xe^{2x}$ التي ت redund من أجل $x=0$

ب) احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_r) والمستقيم (Δ) والمستقيمين ذي المعادلتين $x=0$ و $x=1$

(III) h الدالة العددية المعرفة على $\{0\} - \mathbb{R}$ كما يلي :

أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معروف :

ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة h ، ثم شكل جدول تغيراتها