


على المترشح ان يختار احد الموضوعين التاليين:

الموضوع الاول:

التمرين الأول:

- I. اكسدة السان (A) في وجود  $\text{KMnO}_4$  المركزية ووسط حمضي أعطت مركب (B) لا يرجع محلول فهلنخ، ومركب (C) لمعairee  $m=0.3 \text{ g}$  منه لزم 50 ml من (0.1 N)  $\text{NaOH}$ .
- (C) جد الصيغة نصف المفصلة للمركب (C)
  - نخضع المركب (C) لسلسلة التفاعلات التالية :



- (2) جد الصيغة نصف المفصلة للمركبات : (B) ، (F) ، (E) ، (D)
- (3) استنتاج الصيغة نصف مفصلة للاسان (A)




- II. بلمرة المركب (A) أعطت بوليمر (P)

1) اكتب معادلة البلمرة

2) ما نوع البلمرة

3) اعط مقطع من البوليمر (P) يحتوي على ثلات وحدات بنائية

- III. لتحضير مركب صيدلاني (K) نجري التفاعلات التالية



- (1) جد صيغة المركبات : (K) ، (I) ، (H)
- تنتج عمليا كتلة g 15 من المركب (K) بمدد 70 %
- (2) ما هي عدد مولات المركب (I) المد المستعملة في التحضير

التمرين الثاني :

(I) عينة من زيت تحتوي على 5% من حمض دهني A و 30% من ثنائي غليسيريد DG و ثلاثي غليسيريد TG  
 1) الحمض الدهني A غير مشبع يحتوي على رابطة مضاعفة في الموقع 9 و نسبة الهيدروجين فيه هي 11,81%  
 أ. جد صيغته نصف المفصلة.  
 ب. احسب قرينة الحموسة Ia له

(2) ثالثي غليسيريد متاجنس DG كتلته المولية M=624g/mol يتربّك من الحمض الدهني المشبع B

- أ. جد الصيغة النصف المفصلة للحمض الدهني B  
 ب. استنتج الصيغة الممكنة لثنائي غليسيريد DG

(3) ثلاثي غليسيريد TG من مولين من الحمض الدهني A و مول من الحمض الدهني B في الموقع  $\beta$

أ. أكتب صيغته النصف المفصلة له

ب. أحسب قرينة التصبن Is و قرينة اليود Ii له

ج. احسب قرينة الحموسة، التصبن، الأستر ، اليود لعينة الزيت

يعطى : H : 1g/mol , C : 12g/mol , O :16 g/mol , K : 39 g/mol, I : 127 g/mol

(II) الغلوتاميك Glu حمض أميني سلسلته الجانبية : HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-

1) أكتب صيغته النصف المفصلة

2) ما هو تصنيفه؟

3) أكتب الصيغة الأيونية له عند تغيير الـ pH من 1 إلى 13

pKa<sub>R</sub>= 4,25

, pka<sub>2</sub>= 9,67

, pka<sub>1</sub>= 2,19

4) أحسب قيمة pH<sub>i</sub> له

- ينتج الغلوتاميك عن تحلل إنزيمي لرباعي البيبيتيد : Phe-Asn-Arg-Glu :


1) ما هو الإنزيم المستعمل؟

2) أكتب صيغة البيبيتيد P عند pH=1

- أخضع مزيج من الأحماض الأمينية الناتجة عن التحلل المائي للبيبيتيد (Phe,Arg,Glu) للهجرة الكهربائية


عند pH= 5,48

1) مثل على شريط الهجرة موقع الأحماض الأمينية

الجذر الألكيلي R	$-(\text{CH}_2)_3-\text{NH}-\text{C}(\text{NH}_2)=\text{NH}$	$-\text{CH}_2-$ 	$-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\underset{  }{\text{C}}}-\text{NH}_2$
pHi	Arg:10.76	Phe :5.48	Asn :5.41

التمرين الثالث :


I. نزع الوظيفة الكربوكسيلية من حمض البروبانويك عند درجة الحرارة  $25^{\circ}\text{C}$  يتم وفق التفاعل التالي:



1- احسب أنطاليبي التشكيل  $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2)_{(\text{g})}$ .

$$\Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_6)_{(\text{g})} = -84 \text{ KJ/mol} \quad \Delta H_f^\circ(\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2)_{(\text{L})} = -455 \text{ KJ/mol}$$

يعطى: لدينا التفاعل التالي:



1) احسب أنطاليبي التشكيل  $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O})_{(\text{L})}$

2) أحسب التغير في الطاقة الداخلية  $\Delta U$  للتفاعل 2

$$\Delta H_f^\circ(\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O})_{(\text{L})} = -297 \text{ KJ/mol}$$

يعطى: (3) أكتب معادلة الاحتراق لـ  $(\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2)_{(\text{L})}$


(4) أحسب أنطاليبي الاحتراق  $\Delta H_{\text{Comb}}$  لهذا التفاعل.

(5) أحسب انطاليبي الاحتراق عند درجة الحرارة  $120^{\circ}\text{C}$  لـ  $(\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2)_{(\text{L})}$

$$\Delta H_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}) = 44 \text{ KJ/mol}, \quad \text{Teb}(\text{H}_2\text{O}) = 100^{\circ}\text{C}$$

المركب	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2(\text{L})$	$\text{O}_{2(\text{g})}$	$\text{CO}_{2(\text{g})}$	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{L})}$	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$
$C_p(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$	158.6	29.36	37.58	75.29	33.61

- إليك مخطط تشكل حمض البربانويك السائل.



(1) أكمل مخطط التشكيل  $(\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2)_{(\text{L})}$ .

(2) أحسب طاقة الرابطة  $E_{(\text{C=O})}$  لحمض البربانويك.

$$\Delta H^\circ_{\text{Vap}}(\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2)_{(\text{L})} = 45 \text{ KJ/mol}$$

$$\Delta H^\circ_{\text{sub}}(\text{C})_{(\text{S})} = 717 \text{ KJ/mol}$$

المركبات	(C-H)	(H-H)	(O=O)	(C-O)	(C-C)	(O-H)
$E(\text{KJ/mol})$	413	436	498	351	341.9	464

III. يخضع 1 mol من غاز نعتبره مثالي لتحولات عكوسة :  
التحول a: تحول عند حجم ثابت  $V=14L$  من حالة 1 الى حالة 2 التي تضاعف من درجة حرارته يصاحبها إكتساب طاقة قدرها  $6990,8269 \text{ J}$

التحول b: تحول عند ضغط ثابت ، التي تقلص حجمه الى النصف من حالة 2 الى حالة 3

التحول c : عند درجة حرارة ثابتة من حالة 3 الى الحالة 1 التي تعده الى حجمه الأول

(1) أحسب كل من  $P_3, P_2, P_1, V_3, V_2, V_1, T_3, T_2, T_1$


(2) ارسم المنحنى  $P=f(V)$

(3) أحسب كل من العمل ، كمية الحرارة ، الانطالبي ، التغير في الطاقة الداخلية للتحولات a,b,c

يعطى :  $\frac{C_p}{C_v} = 1,4$  ,  $R = 8,314 \text{ J/mol.K}$  ,  $1\text{atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pas}$

## الموضوع الثاني


### التمرين الأول:



(1) حدد الصيغة العامة للمركب العضوي (A)

(2) جد صيغ نصف مفصلة للمركب (A) والمركب النتريلي

.II. نجري سلسلة تفاعلات انطلاقاً من مركب عضوي مغذريومي و المركب النتريلي



إذا علمت أن المركب (B) كحول كتلته المولية  $M=74\text{gmol}^{-1}$  و مردود التفاعل 7 هو 5%


C : 12 g/mol      H : 1 g/mol      O : 16 g/mol      N : 14 g/mol      يعطى :

(1) جد الصيغ النصف المفصلة للمركبات العضوية : B, C , R-MgCl, D, E, F, J, K, L

(2) أكمل الفراغات لتفاعلات 1,3,5,6

(3) اقترح تفاعلات لتحضير المركب (C) انطلاقاً من المركب (K) وكواشف مناسبة

.III. نحصل على بوليمر صناعي من التفاعل بلمرة المركبين (Y) و (W) حيث:



(1) جد الصيغ نصف مفصلة للمركبات (X), (Y) , (W) ،

(2) اكتب تفاعل بلمرة المركبين (Y) و (W)

(3) مانوع البلمرة ، احسب كثافة البوليمر بدالة n

التمرین الثاني :

I. الىك المركبات:

Is=145 ,07	ارتباط حمض دهني مشبع بالغليسروول في موضع $\beta$ ،	أحادي غليسريد $M_G$
Ii= 0	حمض دهني (X)	$AG_x$
m =2,8g	تفاعل كتلة m=11,4g من الحمض الدهني مع كتلة من هيدروكسيد البوتاسيوم	
نواتج أكسدته ب $KMnO_4$ المركز بوجود حمض مركز :	حمض دهني (y)	$AG_y$
$CH_3-CH_2-COOH$ ، $2(HOOC-CH_2-COOH)$ ، $HOOC-(CH_2)_7-COOH$		
بتشكل من ارتباط أحماض دهنية X و Y بأحادي غليسريد	TG	ثلاثي غليسريد

(1) جد صيغ نصف مفصلة لـ : احادي غليسريد و حمض دهني X و حمض دهني Y وثلاثي غليسريد

(2) أنساب درجتي الانصهار  $T_{fus}$ :  $76^{\circ}C$  و  $11^{\circ}C$ - للحمضين X و Y

(3) أكتب تفاعل هدرجة ثلاثي غليسريد

(4) احسب Ia, Ii, Is دليل التصبن واليود لثلاثي غليسريد

- عينة من زيت دليل اليود لها Ii= 91 تتكون من نسبة A% من حمض دهني x و 2% من حمض دهني y ونسبة


B% من ثلاثي غليسريد

(1) جد نسبة ثلاثي غليسريد لعينة الزيت B%

(2) احسب قرينة حموضة لهذه العينة Ia

C :12g/mol      H :1g/mol      O :16 g/mol      K :39 g/mol      I :127g /mol

II. تعطي التفاعلات الآتية :




(1) اكمل التفاعلين 2 و 3

(2) صنف الاحماض الامنية (Thr ,Lys,Ile)

(3) اعط تمثيل فيشر للايزولوسين Ile.

- (4) نجري اختبار كزانتوبروتيك على محلول الاحماس الامينية السابقة  
(5) ما هي مكونات كاشف كزانتوبروتيك وما نتيجة الاختبار  
(6) اكتب الصيغة الشاردية لببتيد (P) صيغته Ile-Thr-Lys-Cys-Trp-Asp عند  $\text{PH}=1$   
(7) يعطي شريط الهجرة الكهربائية لمزيج الاحماس الامينية الناتجة من الاماهة الحامضية للببتيد (P) عند  $\text{PH}=5,85$



- (8) حدد الاحماس الامينية A,B,C,D,E,F,  
(9) اكتب الصيغة الشاردية للاحماس الامينية (F) و (C) و الصيغة السائدة لها  
(10) أحسب  $\text{pK}_{\text{a}1}$  للحمض الاميني Cys  
(11) أكتب نواتج الاماهة الانزيمية لهذا الببتيد مستعملا رموز الاحماس الامينية  
أ. بإنزيم تربسين  
ب. بالكيموتروبسين  
المعطيات

Lys : $\text{PHi}=9,74$       Ile : $\text{PHi}=6,02$       Thr : $\text{PHi}=5,60$

الحمض الاميني	السلسلة الجانبية	$\text{PHi}$	$\text{PKa}_1$	$\text{PKa}_2$	$\text{PKa}_R$
Cys		5,07	.....	10,8	8,18
Trp		.....	2,31	9,39	//////
Asp		.....	1,88	9,6	3,66


### التمرين الثالث :

- I. مسعر حراري سعته الحرارية  $C_{\text{cal}}$  نضع به 200mL من ماء درجة حرارته  $25^{\circ}\text{C}$  و نضيف له 300mL من ماء درجة حرارته  $80^{\circ}\text{C}$  ، عند التوازن نسجل درجة حرارة  $52,07^{\circ}\text{C}$   
(1) أحسب السعة الحرارية للمسعر  
(2) أحسب مكافئه المائي.  
(3) إذا كان المسعر مصنوع من الألمنيوم ، أحسب كتلته .

نضع بالمسعر السابق وهو في حالة توازن كتلة من الجليد  $m$  درجة حرارتها  $10^{\circ}\text{C}$ - عند التوازن نسجل درجة حرارة قدرها  $47,61^{\circ}\text{C}$   
(4) أحسب كتلة الجليد المستعملة

$$\text{Ceau} = 4,185 \text{ J/g.K}, C_{\text{H}_2\text{O}(s)} = 2,1 \text{ J/g.K}, L_{\text{fus}} = 335 \text{ J/g}, C_{\text{Al}} = 24,35 \text{ J/mol.K}, \rho(\text{H}_2\text{O}) = 1 \text{ g/ml}, \text{Al} : 27 \text{ g/mol}$$

لدينا 0.5 mol من غاز مثالي يخضع للتحولات التالية :



	A الحالة	B الحالة	C الحالة
P(atm)	2	4	$P_C = P_A$
V(L)	.....	$V_A = V_B$	$V_C = 2V_A$
T(K)	292.42	.....	$T_C = T_B$

1- احسب الحجم  $V_A$  الذي يشغل هذا الغاز واستنتج درجة الحرارة  $T_B$ .




2- أعط المخطط المناسب لهاته التحولات  $P = f(V)$

3- جد قيم كل من:  $W_{A \rightarrow B}, W_{B \rightarrow C}, Q_{A \rightarrow B}, Q_{C \rightarrow A}$

$R = 8.314 \text{ J/mol.K}$      $C_P = 20.78 \text{ J/mol.K}$      $C_V = 12.47 \text{ J/mol.K}$      $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$   
 II. يتم تحضير إيثيل بنزن السائل عند  $25^\circ\text{C}$  وفق التفاعل التالي:



(1) أحسب انتطابي هذا التفاعل علماً أن:



$$\Delta H_{vap}(H_2O) = 44 \text{ Kj/mol}$$

(2) أحسب انتطابي تشكيل إيثيل بنزن السائل.

يعطى:  $\Delta H_f(C_6H_6)_{(L)} = 49 \text{ Kj/mol}$ ,  $\Delta H_f(H_2O)_{(L)} = -286 \text{ Kj/mol}$

(3) أحسب طاقة الرابطة  $E_{C=C}$  في إيثيل بنزن السائل

يعطى:  $\Delta H_{Sub(C)} = 717 \text{ Kj/mol}$ ,  $\Delta H_{Vap(C_8H_{10})} = 42,5 \text{ Kj/mol}$

الرابطة	H-H	O=O	C-C	C-H
E (Kj/mol)	436	498	348	413

(4) أحسب انتطابي التفاعل (1) عند  $90^\circ\text{C}$ . يعطى:

المركب	$C_{(s)}$	$H_{2(g)}$	$O_{2(g)}$	$C_2H_5OH_{(g)}$	$C_2H_5OH_{(L)}$
$C_p \text{ (J/mol.K)}$	$11 + 48 \times 10^{-4} T + 12 \times 10^{-7} T^2$	$6,65 + 9 \times 10^{-4} T$	$26,47 + 9,73 \times 10^{-3} T$	65,44	111,46
$T_{eb(C_2H_5OH)} = 78^\circ\text{C}$			$\Delta H_{Vap(C_2H_5OH)} = 38,5 \text{ Kj/mol}$		