



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
وزارة التربية الوطنية

دورة: 2020



الديوان الوطني لامتحانات والمسابقات  
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبية: رياضيات

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

**الموضوع الأول**

التمرين الأول: (04 نقاط)

الدالة العددية  $f$  معرفة على المجال  $[1; 4]$  بـ:  $f(x) = \frac{4x+4}{9-x}$ .

أ. ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$  على المجال  $[1; 4]$ .

ب. أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $[1; 4]$  فإن:  $f(x) \in [1; 4]$ .

(2) المتالية العددية  $(u_n)$  معرفة بحدها الأول  $u_0$  حيث:  $u_0 = 2$  و من أجل كل عدد طبيعي  $n$ :

أ. برهن بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ :  $u_n < 4$ .

ب. ادرس اتجاه تغير المتالية  $(u_n)$  و استنتج أنها متقاربة.

(3) المتالية العددية  $(v_n)$  معرفة من أجل كل عدد طبيعي  $n$ ، كما يلي:

أ. برهن أن المتالية  $(v_n)$  هندسية يتطلب تعين أساسها وحدتها الأول  $v_0$ .

ب. عَنْ الحد العام  $v_n$  بدلالة  $n$  ، ثم استنتاج الحد العام  $u_n$  بدلالة  $n$  واحسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

(4) المجموع  $S_n$  معرف بـ:  $S_n = v_0 + 8v_1 + 8^2v_2 + \dots + 8^n v_n$ . احسب  $S_n$  بدلالة  $n$ .


التمرين الثاني: (04 نقاط)

صندوق به 5 كريات بيضاء و 3 كريات حمراء (كل الكريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس).

نسحب من الصندوق كرية واحدة حيث: إذا ظهرت كرية حمراء نعيدها إلى الصندوق ونضيف لها كرية بيضاء

إذا ظهرت كرية بيضاء نعيدها إلى الصندوق ونضيف لها كرية حمراء، ثم نكرر العملية مرة ثانية.

(1) انقل شجرة الاحتمالات المقابلة التي تُمذج هذه التجربة ثم أكملاها.



(2) بين أن احتمال أن يوجد في الصندوق 7 كريات بيضاء هو  $\frac{1}{8}$ .

(3) احسب احتمال أن يوجد في الصندوق 4 كريات حمراء على الأقل.

(4) ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يأخذ قيمة عدد الكريات البيضاء الموجودة في الصندوق بعد العملية الثانية.

أ. بَرِّأْ قيم المتغير العشوائي  $X$  هي: 5، 6 و 7.

ب. عَرَفْ قانون الاحتمال للمتغير العشوائي  $X$  ، ثم احسب  $E(X)$  أمله الرياضي.



**التمرين الثالث: (05 نقاط)**

ليكن  $n$  عدداً طبيعياً أكبر تماماً من 1.

نعتبر الأعداد الطبيعية  $a$  ،  $b$  و  $c$  حيث :  $b = 6n + 1$  ،  $a = 4n + 1$  و  $c = 3n + 2$ .

(1) أثبت أن العددين  $a$  و  $b$  أوليان فيما بينهما.

(2) نسمى  $\alpha$  القاسم المشترك الأكبر للعددين  $a$  و  $c$ .

أثبت أن  $\alpha$  يقسم 5 ، ثم عين الأعداد الطبيعية  $n$  بحيث يكون:  $\alpha = 5$ .

(3) نسمى  $\beta$  القاسم المشترك الأكبر للعددين  $a$  و  $bc$ .

أ. أثبت أن  $\alpha$  يقسم  $\beta$ .

ب. أثبت أن العددين  $\beta$  و  $b$  أوليان فيما بينهما ثم استنتج أن:  $\alpha = \beta$ .

(4) نعتبر العددين الطبيعيين  $A$  و  $B$  حيث:  $A = 4n^2 - 3n - 1$  و  $B = 18n^3 - 3n^2 - 13n - 2$ .

أ. بين أن كلاً من العددين  $A$  و  $B$  مضاعف للعدد الطبيعي  $(n-1)$ .

ب. نضع:  $(bc = 18n^2 + 15n + 2)$ . عَّبر حسب قيم  $\alpha$  عن  $d$  بدلالة  $n$ . (لاحظ أن:  $PGCD(A; B) = d$ ).

**التمرين الرابع: (07 نقاط)**

(I) الدالتان العدديتان  $g$  و  $h$  معرفتان على المجال  $[0; +\infty]$  كما يلي:  $g(x) = -2e^x$  و  $h(x) = x(e^x + 1)$ . حدد إشارة كل من  $g(x)$  و  $h(x)$  على المجال  $[-\infty; 0]$ .

(II) الدالة العددية  $f$  معرفة على المجال  $[0; +\infty]$  بـ:  $f(x) = (x-3)e^x + \frac{1}{2}x^2$ .

تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتتجانس  $(C_f)$ .

(1) أ. بين أنه من أجل كل  $x$  من المجال  $[-\infty; 0]$ :  $f'(x) = h(x) + g(x)$ .

ب. استنتاج اتجاه تغير الدالة  $f$  على المجال  $[-\infty; 0]$ .

(2) احسب  $f(0)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  ثم شُكّل جدول تغيرات الدالة  $f$ .

(3) بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلًا وحيداً  $\alpha$  في المجال  $[0; +\infty]$  ثم تحقق أن:  $-1.4 < \alpha < -1.5$ .

(4)  $(P)$  هو التمثيل البياني للدالة:  $x \mapsto \frac{1}{2}x^2 + x$  على المجال  $[-\infty; 0]$ .

أ. احسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - \frac{1}{2}x^2]$  ثم فسر النتيجة بيانياً.

ب. ادرس الوضع النسبي للمنحنين  $(P)$  و  $(C_f)$ .

ج. أنشئ  $(P)$  ثم المنحنى  $(C_f)$  على المجال  $[-\infty; 0]$ .

(5) ليكن  $m$  وسيطاً حقيقياً، ناقش بيانياً وحسب قيم  $m$  عدد حلول المعادلة:  $|f(x)| = e^m$  في  $[-\infty; 0]$ .

**انتهى الموضوع الأول**



### الموضوع الثاني

#### التمرين الأول: (04 نقاط)

- (1) حل المعادلة:  $2 = 3x - 5y$  ذات المجهول  $(x; y)$  حيث  $x$  و  $y$  عدوان صحيحان.
- (2) أ. ادرس تبعاً لقيم العدد الطبيعي  $n$  باقي القسمة الإقلية للعدد الطبيعي  $9^n$  على 7 .  
ب. ادرس تبعاً لقيم العدد الطبيعي  $n$  باقي القسمة الإقلية للعدد الطبيعي  $4^n$  على 11 .
- (3) عين الأعداد الطبيعية  $n$  بحيث يكون:  $[77] = 14 \times 4^n + 11 \times 9^n - 4$ .
- (4) ليكن  $n$  عدداً طبيعياً غير معروف، نضع:  $S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{15n}$  و  $u_n = 3 \times 4^n + 4 \times 9^n$   
أ. عبر عن  $S_n$  بدلالة  $n$ .  
ب. أثبت أن  $S_n$  مضاعف للعدد 77 .

#### التمرين الثاني: (04 نقاط)

- يحتوي صندوق على كريات متماثلة منها:  $n$  كرية بيضاء تحمل العدد  $\pi$  ( $n \geq 2$  عدد طبيعي و 2 ) و 4 كريات حمراء تحمل الأعداد  $\frac{\pi}{3}$  ،  $\frac{\pi}{2}$  ،  $\frac{\pi}{2}$  و  $\frac{\pi}{2}$  و كريتين خضراء تحملان العددين  $\frac{\pi}{2}$  و  $\frac{\pi}{2}$  .  
نسحب عشوائياً كريتين في آن واحد من هذا الصندوق.
- (1) أ. احسب احتمال كل من  $A$  و  $B$  حيث:  
 $A$  : "سحب كريتين من نفس اللون" و  $B$  : "سحب كريتين تحملان نفس العدد علماً أنهما من نفس اللون"

- ب. عين العدد الطبيعي  $n$  حتى يكون:  $P(A) = \frac{17}{55}$ .
- (2) نفرض في ما يلي:  $n = 5$  و نسمي  $\alpha$  و  $\beta$  العددين الظاهرين على الكريتين المسحوبتين .  
نعتبر  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة سحب العدد:  $\cos(\alpha)\cos(\beta)$   
أ. ببرأ أنّ قيم المتغير العشوائي  $X$  هي:  $1, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, 1$ .  
ب. بيّن أنّ:  $P(X = 0) = \frac{27}{55}$ .  
ج. عين قانون احتمال المتغير العشوائي  $X$  واحسب أمله الرياضيتي  $E(X)$ .

#### التمرين الثالث: (05 نقاط)

- الممتاليتان العدديتان  $(v_n)$  و  $(u_n)$  معرفتان على  $\mathbb{N}$  بـ:
- $$\left\{ \begin{array}{l} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = 3\alpha v_n + (1-3\alpha)u_n \end{array} \right. \quad \text{و} \quad \left\{ \begin{array}{l} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = 3\alpha u_n + (1-3\alpha)v_n \end{array} \right.$$
- الممتالية العددية  $(w_n)$  معرفة على  $\mathbb{N}$  بـ:  $w_n = v_n - u_n$



أ. احسب  $w_0$  ثم احسب  $w_1$  بدلالة  $\alpha$ .

ب. بيّن أن  $(w_n)$  متالية هندسية أساسها  $(6\alpha - 1)$ .

ج. اكتب عبارة  $w_n$  بدلالة  $n$  و  $\alpha$  ، ثم عيّن قيم  $\alpha$  حتى تكون:  $0 < w_n = 0$

نفرض في كل ما يلي:  $\frac{1}{6} < \alpha < \frac{1}{3}$

أ. أثبت أن المتالية  $(u_n)$  متزايدة تماماً وأن  $(v_n)$  متناقصة تماماً.

ب. استنتج أن  $(u_n)$  و  $(v_n)$  متقاربتان نحو نفس النهاية  $\ell$ .

ج. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ :  $u_n + v_n = 2$  ، واستنتاج قيمة  $\ell$ .

د. احسب بدلالة  $\alpha$  المجموع  $S$  حيث:  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{2020}$

#### التمرين الرابع: (07 نقاط)

الدالة العددية  $f$  معرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:

ليكن  $(C_f)$  المنحني البياني للدالة  $f$  في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

أ. احسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  ، ثم بيّن أن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ :

ب. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  لدينا:

ج. استنتاج اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها.

نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على المجال  $[0; +\infty]$  كما يلي:

أ. بيّن أن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ .

ب. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $[0; +\infty]$  :

ج. ادرس اتجاه تغير الدالة  $g$  على المجال  $[0; +\infty]$  ثم شكل جدول تغيراتها. (نأخذ  $\sqrt{9x^2 + 1} \approx 3x$ ).

أ. بيّن أن المعادلة  $0 = g(x)$  تقبل حل واحداً  $\alpha$  في المجال  $\left[\frac{2\sqrt{2}}{3}; +\infty\right]$  ثم تحقق أن:  $2.83 < \alpha < 2.84$ .

ب. استنتاج إشارة  $g(x)$  على  $[0; +\infty]$ .

ج. حدد الوضع النسبي للمسقط  $(\Delta)$  ذي المعادلة  $x = y$  و المنحني  $(C_f)$  على المجال  $[0; +\infty]$ .

نعتبر الدالة  $k$  المعرفة على  $[0; +\infty]$  بـ:  $k(x) = \ln(6x)$  و ليكن  $(\gamma)$  منحنيها البياني في المعلم السابق.

أ. بيّن أن  $(\gamma)$  هو صورة منحني الدالة:  $x \mapsto \ln x$  بتحويل نقطي بسيط يطلب تعينه.


ب. احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - k(x)]$  ثم فسر النتيجة بيانياً.

أ. بيّن الدالة  $f$  فردية.

ب. انشئ كلا من  $(\Delta)$  ،  $(\gamma)$  و  $(C_f)$  على المجال  $[0; +\infty]$  ثم استنتاج انشاء المنحني  $(C_f)$  على  $\mathbb{R}$ .

العلامة المجموعة	مجزأة	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
التمرين الأول: (04 نقاط)		
0.75	2x0.25 0.25	<p>(1) أ. لدينا: <math>f'(x) = \frac{40}{(9-x)^2}</math> ومنه <math>f</math> متزايدة تماماً على <math>[1;4]</math>.</p> <p>ب. من أجل: <math>x \in [1;4]</math> يكون <math>f(x) \in [f(1); f(4)]</math></p>
1.25	2x0.25 2x0.25 0.25	<p>(2) أ. البرهان بالترابع.</p> <p>ب. لدينا: <math>u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 1)(u_n - 4)}{9 - u_n}</math> ونجد أن <math>(u_n)</math> متاقصة تماماً.</p> <p>الاستنتاج: <math>(u_n)</math> متاقصة تماماً و محدودة من الأسفل فهي متقاربة.</p>
1.25	2x0.25 2x0.25 0.25	<p>(3) أ. لدينا: <math>v_0 = -\frac{1}{2}</math> و <math>v_n = \frac{5}{8}v_n</math> هندسية أساسها <math>\frac{5}{8}</math> ومنه <math>(v_n)</math> هندسية أساسها <math>\frac{5}{8}</math> و منه <math>v_n = \frac{-1}{2}\left(\frac{5}{8}\right)^n</math></p> <p>ب. عبارة <math>v_n</math> و عبارة <math>u_n</math> مترابطة: <math>u_n = \frac{-1}{2}\left(\frac{5}{8}\right)^n</math></p> <p>حساب: <math>\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1</math></p>
0.75	0.75	(4). نجد: $S_n = \frac{-1}{8}(5^{n+1} - 1)$
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
1.25	0.25x5	<p>(1) شجرة الاحتمالات:</p> <pre> graph LR     Root(( )) -- "3/8" --&gt; R1((R))     Root -- "5/8" --&gt; R2((B))     R1 -- "3/9" --&gt; R3((R))     R1 -- "6/9" --&gt; R4((B))     R2 -- "4/9" --&gt; R5((R))     R2 -- "5/9" --&gt; R6((B))   </pre>
0.5	0.5	(2) احتمال أن يوجد في الصندوق 7 كريات بيضاء: $\frac{3}{8} \times \frac{3}{9} = \frac{1}{8}$
0.75	0.75	(3) احتمال أن يوجد في الصندوق 4 كريات حمراء على الأقل: $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$
1.50	0.5 0.75 0.25	<p>(4) أ. تبرير أن قيم المتغير العشوائي <math>X</math> هي: 5 ، 6 و 7</p> <p>ب. تعريف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي.</p> $E(X) = \frac{52}{9}$
التمرين الثالث: (05 نقاط)		
0.75	0.75	(1) لدينا: $3a - 2b = 1$ ، إذن حسب بيزو $a$ و $b$ أوليان فيما بينهما
1.5	0.75 0.75	(2) لدينا: $\alpha   5$ و $\alpha   a$ و $\alpha   c$ و $\alpha   (4c - 3a)$ ومنه: $\alpha   c$ أي $c \equiv 0 \pmod{5}$ و $a \equiv 0 \pmod{5}$ و $n = 5k + 1$ و $n \equiv 1 \pmod{5}$ ومنه $n \equiv 1 \pmod{25}$ أي $n = 25m + 1$ و $m \in \mathbb{N}$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
1.5	0.5	<p>(3) أ . إثبات أن <math>\alpha \beta</math> يقسم <math>\alpha</math> . لدينا <math>\alpha   \beta</math> ومنه <math>\alpha   bc</math> أي <math>\alpha   p \gcd(a, bc)</math> وبالتالي <math>\alpha   a</math> .</p> <p>ب. إثبات أن <math>\beta</math> و <math>b</math> أوليان فيما بينهما: نفرض أن <math>d</math> قاسم مشترك لـ <math>\beta</math> و <math>b</math>. أي <math>d   \beta</math> و <math>d   b</math> . وبالتالي <math>d   p \gcd(a, b)</math> ومنه <math>d   a</math> .</p> <p>ملاحظة: يمكن استعمال مبرهنة بيزو</p> <p>استنتاج أن: <math>\alpha = \beta</math> : <math>\beta   \alpha</math> و <math>\alpha   \beta</math> .</p> $\beta   \alpha \text{ و } \alpha   \beta \Rightarrow \beta   a \text{ و } \alpha   b \Rightarrow \alpha = \beta$ $\alpha = \beta \text{ معناه } (\beta   \alpha \text{ و } \alpha   \beta)$
	0.5	
	0.5	
1.25	0.5	<p>(4) أ . لدينا <math>B = (n-1)bc</math> إذن كلّاً من <math>A = (n-1)(4n+1)</math> و <math>B</math> مضاعف لـ <math>(n-1)</math> .</p> <p>ب. لدينا <math>d = (n-1)PGCD(a, bc)</math> ومنه <math>d = PGCD(A, B)</math> .</p> <p>ومنه <math>d = (n-1)\beta = (n-1)\alpha</math> .</p> <p>من أجل <math>d = 5n-5</math> : <math>\alpha = 5</math> ، من أجل <math>d = n-1</math> : <math>\alpha = 1</math> .</p>
	0.25x3	
التمرين الرابع : (7 نقاط)		
0.5	0.25x2	(I) من أجل $g(x) < 0$ و $h(x) \leq 0$ : $x \in ]-\infty; 0]$
1.25	0.5+0.25	<p>(II) أ. من أجل كل <math>x</math> من <math>]-\infty; 0]</math> :</p> $f'(x) = x(e^x + 1) + (-2e^x) = h(x) + g(x)$
	0.5	ب. متاقصة تماماً على المجال $]-\infty; 0]$ .
1	0.25x2 0.5	(2) نجد: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x - 3e^x + \frac{1}{2}x^2) = +\infty$ ، $f(0) = -3$ .
1	0.75	جدول التغيرات
	0.25	(3) $f$ مستمرة ومتاقصة تماماً على المجال $[-\infty; +\infty]$ . وتأخذ قيمها في $[-\infty; 0]$ .
1.75	0.5x2	ومنه $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً $\alpha$ في $[-\infty; 0]$ .
		التحقق أن $f(-1,4) \approx -0,105$ ، $f(-1,5) \approx 0,121$ : $\alpha \in [-1,5; -1,4]$ .
	0.5+0.25	<p>(4) أ . نجد: <math>\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - \frac{1}{2}x^2) = 0</math> .</p> <p>ب. من أجل كل <math>x</math> من <math>]-\infty; 0]</math> :</p> $f(x) - \frac{1}{2}x^2 = (x-3)e^x$ <p>ومنه <math>f(x) - \frac{1}{2}x^2 &lt; 0</math> .</p>

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعه	مجزأة	
0.75	0.25 0.5	 <p>ج. إنشاء <math>(C_f)</math> و <math>(P)</math>:</p>
0.75	$0.25 \times 3$	<p>5) المناقشة البيانية وحسب قيم <math>m</math> عدد حلول المعادلة: <math> f(x)  = e^m</math> في <math>]-\infty ; 0]</math> من أجل <math>m \leq \ln 3</math> المعادلة تقبل حلّين مختلفين.</p> <p>من أجل <math>m &gt; \ln 3</math> المعادلة تقبل حلّ واحد</p>

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)											
مجموعه	مجازأة												
		التمرين الأول: (04 نقاط)											
1	1	$k \in \mathbb{Z}$ حيث $(x; y) = (5k - 1; 3k - 1)$ (1)											
1	0.5	أ) باقي القسمة الأقلية للعدد $9^n$ على 7 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td><math>n</math></td> <td><math>3k</math></td> <td><math>3k+1</math></td> <td><math>3k+2</math></td> </tr> <tr> <td>باقي القسمة</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table> $(k \in \mathbb{N})$	$n$	$3k$	$3k+1$	$3k+2$	باقي القسمة	1	2	4			
$n$	$3k$	$3k+1$	$3k+2$										
باقي القسمة	1	2	4										
0.5	ب) باقي القسمة الأقلية للعدد $4^n$ على 11 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td><math>n</math></td> <td><math>5k'</math></td> <td><math>5k'+1</math></td> <td><math>5k'+2</math></td> <td><math>5k'+3</math></td> <td><math>5k'+4</math></td> </tr> <tr> <td>باقي القسمة</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>3</td> </tr> </table> $(k' \in \mathbb{N})$	$n$	$5k'$	$5k'+1$	$5k'+2$	$5k'+3$	$5k'+4$	باقي القسمة	1	4	5	9	3
$n$	$5k'$	$5k'+1$	$5k'+2$	$5k'+3$	$5k'+4$								
باقي القسمة	1	4	5	9	3								
1	0.25×3	(3) بما أن 7 و 11 أوليان فيما بينهما فإن: $\begin{cases} 9^n \equiv 1[7] \\ 4^n \equiv 5[7] \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} 11 \times 9^n - 4 \equiv 0[7] \\ 14 \times 4^n - 4 \equiv 0[11] \end{cases}$ يعني $\begin{cases} 14 \times 4^n + 11 \times 9^n - 4 \equiv 0[7] \\ 14 \times 4^n + 11 \times 9^n - 4 \equiv 0[11] \end{cases}$ أي: $3\alpha - 5\beta = 2$ وهذه عدان طبيعيان $(p \in \mathbb{N}^*)$ . حيث $(\alpha; \beta) = (5p - 1; 3p - 1)$ . ومنه $n = 15p - 3$											
	0.25												
1	0.5	$. S_n = 4(4^{15n} - 1) + \frac{9}{2}(9^{15n} - 1)$ . (4) ب. إثبات أن $S_n$ مضاعف للعدد 77 . $2S_n \equiv 0[77]$ يعني $S_n \equiv 0[77]$											
	0.5	$\begin{cases} 8(4^{15n} - 1) + 9(9^{15n} - 1) \equiv 0[7] \\ 8(4^{15n} - 1) + 9(9^{15n} - 1) \equiv 0[11] \end{cases}$ أي $8(4^{15n} - 1) + 9(9^{15n} - 1) \equiv 0[77]$ محققة دوما $\begin{cases} (1)^{5n} - 1 \equiv 0[7] \\ (1)^{3n} - 1 \equiv 0[11] \end{cases}$ أي $\begin{cases} (4^3)^{5n} - 1 \equiv 0[7] \\ (9^5)^{3n} - 1 \equiv 0[11] \end{cases}$ أي $\begin{cases} 4^{15n} - 1 \equiv 0[7] \\ 9^{15n} - 1 \equiv 0[11] \end{cases}$											
التمرين الثاني: (04 نقاط)													
1.5	0.5×2	$P(B) = \frac{n^2 - n + 2}{n^2 - n + 14}$ ، $P(A) = \frac{n^2 - n + 14}{(n+5)(n+6)}$ . (1)											
	0.5	ب. $n = 5$ يعني $P(A) = \frac{17}{55}$											
1	0.5	(2) أ. بعد الحساب نجد قيم المتغير العشوائي $X$ . $P(X = 0) = \frac{C_3^1 \times C_8^1 + C_3^2}{C_{11}^2} = \frac{27}{55}$ .											
	0.5												

العلامة	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)														
مجموعه	مجزأة														
1.5	1 0.5	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td><math>x_i</math></td> <td><math>\frac{-1}{2}</math></td> <td>0</td> <td><math>\frac{1}{4}</math></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><math>p(X=x_i)</math></td> <td><math>\frac{12}{55}</math></td> <td><math>\frac{27}{55}</math></td> <td><math>\frac{1}{55}</math></td> <td><math>\frac{15}{55}</math></td> </tr> </table>	$x_i$	$\frac{-1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	1	$p(X=x_i)$	$\frac{12}{55}$	$\frac{27}{55}$	$\frac{1}{55}$	$\frac{15}{55}$	<p>ج. قانون احتمال <math>X</math></p> $E(X) = \frac{37}{220}$		
$x_i$	$\frac{-1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	1											
$p(X=x_i)$	$\frac{12}{55}$	$\frac{27}{55}$	$\frac{1}{55}$	$\frac{15}{55}$											
التمرين الثالث: (05 نقاط)															
2	2×0.25 0.5 0.5 0.5		<p>أ. <math>w_1 = 4(6\alpha - 1)</math> ، <math>w_0 = 4</math> .</p> <p>ب. <math>w_n</math> متالية هندسية أساسها <math>(6\alpha - 1)</math> .</p> <p>ج. <math>w_n = 4(6\alpha - 1)^n</math> .</p> <p><math>0 &lt; \alpha \leq \frac{1}{3}</math> يعني <math>-1 &lt; 6\alpha - 1 \leq 1</math> . <math>\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0</math></p>												
1.75	0.5 0.5 0.5 0.25		<p>أ. <math>u_{n+1} - u_n = -(3\alpha - 1)w_n</math> . ومنه المتالية <math>(u_n)</math> متزايدة تماماً .</p> <p>ب. <math>v_{n+1} - v_n = (3\alpha - 1)w_n</math> . ومنه المتالية <math>(v_n)</math> متناقصة تماماً .</p> <p>بما أن المتالية <math>(u_n)</math> متزايدة تماماً و المتالية <math>(v_n)</math> متناقصة تماماً و <math>\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0</math> فإنهما متقاربان وبالتالي متقاربان نحو نفس النهاية <math>\ell</math> .</p>												
0.75	0.5 0.25		<p>أ. لدينا <math>v_{n+1} - v_n = (3\alpha - 1)w_n</math> و <math>u_{n+1} - u_n = -(3\alpha - 1)w_n</math> .</p> <p><math>u_{n+1} + v_{n+1} = u_n + v_n = u_0 + v_0 = 2</math></p> <p><math>\ell = 1</math> ومنه <math>\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = 2</math> . استنتاج قيمة <math>\ell</math> :</p>												
0.5	0.5			<p>ج. <math>S = 2021 - \frac{(6\alpha - 1)^{2021} - 1}{3\alpha - 1}</math></p>											
التمرين الرابع: (07 نقاط)															
1.75	2×0.25 0.25 0.5 0.25 0.25		<p>أ. <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty</math> . (مع التبرير) .</p> <p>اثبات أن <math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty</math> :</p> <p>ب. من أجل كل <math>x</math> من <math>\mathbb{R}</math> . <math>f'(x) = \frac{3}{\sqrt{9x^2 + 1}}</math> :</p> <p>ج. من أجل كل <math>x</math> من <math>\mathbb{R}</math> ، إذن <math>f'(x) &gt; 0</math> : <math>f</math> متزايدة تماماً على <math>\mathbb{R}</math> .</p> <p>جدول تغيرات الدالة <math>f</math> .</p>												
1	0.5 0.5		<p>أ. تبيان أن <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty</math></p> <p>ب. تبيان أن من أجل كل <math>x \geq 0</math> ، <math>g'(x) = \frac{-9x^2 + 8}{(\sqrt{9x^2 + 1})(3 + \sqrt{9x^2 + 1})}</math></p>												

العلامة	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)									
مجموعة	مجزأة									
0.75	0.25	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td><math>x</math></td> <td>0</td> <td><math>\frac{2\sqrt{2}}{3}</math></td> <td><math>+\infty</math></td> </tr> <tr> <td><math>g'(x)</math></td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>ج. إشارة <math>g'(x)</math> هي من إشارة <math>.(-9x^2 + 8)</math>.</p>	$x$	0	$\frac{2\sqrt{2}}{3}$	$+\infty$	$g'(x)$	+	0	-
$x$	0	$\frac{2\sqrt{2}}{3}$	$+\infty$							
$g'(x)$	+	0	-							
0.25	$\left[ \frac{2\sqrt{2}}{3}; +\infty \right]$ و متاقصة تماماً على المجال $g$ متزايدة تماماً على المجال $\left[ 0; \frac{2\sqrt{2}}{3} \right]$									
0.25	جدول تغيرات الدالة $g$									
1.5	0.5	$\left] -\infty; g\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \right]$ وتأخذ قيمها في المجال $\left[ \frac{2\sqrt{2}}{3}; +\infty \right]$ أ. $g$ مستمرة ورتبة تماماً على المجال $(3)$								
	0.25	التحقق من أن $g(0.83) \approx 0.001$ و $g(0.84) \approx -0.005$ : $2,83 < \alpha < 2,84$								
	0.25	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td><math>x</math></td> <td>0</td> <td><math>\alpha</math></td> <td><math>+\infty</math></td> </tr> <tr> <td><math>g(x)</math></td> <td>0</td> <td>+</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>ب. استنتاج إشارة <math>g(x)</math> على المجال <math>[0; \alpha]</math></p>	$x$	0	$\alpha$	$+\infty$	$g(x)$	0	+	0
$x$	0	$\alpha$	$+\infty$							
$g(x)$	0	+	0							
0.5	<p>ج. الوضع النسبي : <math>(C_f)</math> فوق <math>(\Delta)</math> على المجال <math>[\alpha; +\infty]</math> تحت <math>(\Delta)</math> على المجال <math>(C_f)</math></p> <p><math>\alpha</math> و نقطتين فاصلتهما 0 و <math>(\Delta)</math> و <math>(C_f)</math></p>									
0.75	0.25	<p>أ. لدينا <math>k(x) = \ln x + \ln 6</math> إذن <math>(\gamma)</math> هو صورة المنحني الممثل للدالة <math>x \mapsto \vec{u}(0; \ln 6)</math>.</p>								
	2×0.25	ب. نستنتج أن $(\gamma)$ منحني مقايرب لـ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - k(x)) = 0$ بجوار $+\infty$ .								
1.25		<p>5. إثبات أن الدالة <math>f</math> فردية.</p> <p>ب. رسم كـ من <math>(\gamma)</math> على المجال <math>[0; +\infty]</math> و <math>(C_f)</math> على المجال <math>[0; +\infty]</math> و رسم <math>f</math> على <math>\mathbb{R}</math>.</p> <p>استنتاج الرسم للمنحني <math>(C_f)</math> على <math>\mathbb{R}</math>.</p>								
	0.25									
	3×0.25									
	0.25									