

الحل موضوع من الموضوعينالموضوع 01التمرين الأول: (04 نقاط)

لتكن  $f$  الدالة المعرفة على المجال  $[0; +\infty]$  بـ

• ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$  على المجال  $[0; +\infty]$

نعتبر المتالية  $(u_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  بـ

$$\begin{cases} u_0 = \frac{5}{4e} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

• الشكل في الورقة المرفقة يمثل المنحنى  $(C)$  للدالة  $f$  على المجال  $[0; +\infty]$  والمستقيم  $(D)$  الذي معادلته  $x = y$ .

(1) مثلا على محور الفواصل الحدود ،  $u_0$  ،  $u_1$  ،  $u_2$  و  $u_3$  دون حسابها مبرزا خطوط الرسم.

ب) ما تخيينك حول إتجاه تغير المتالية  $(u_n)$  و تقارها ؟

(2) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :

$$u_{n+1} = \frac{2}{e} \left( 1 - \frac{1}{eu_n + 1} \right)$$

ب) برهن بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :

$$u_n > \frac{1}{e}$$

ج) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{eu_n \left( \frac{1}{e} - u_n \right)}{eu_n + 1}$$

(3) نعتبر المتالية  $(v_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  بـ

$$v_n = \frac{eu_n}{eu_n - 1}$$

أ) بين أن  $(v_n)$  متالية هندسية أساسها 2 يطلب تعين حدتها الأول  $v_0$ .

ب) عبر  $v_n$  و  $u_n$  عن بدلالة  $n$  ثم احسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

ج) أحسب المجموع  $S_n$  بدلالة  $n$  حيث :

$$S_n = \frac{1}{(eu_0 - 1)^2} + \frac{1}{(eu_1 - 1)^2} + \dots + \frac{1}{(eu_n - 1)^2}$$
التمرين الثاني: (05 نقاط)

لكل سؤال ثالث إجابات ، إجابة واحدة منها صحيحة ، المطلوب: تحديد الإجابة الصحيحة مع التبرير

1- جذور العدد المركب  $i$  - هي:

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \quad ج \quad -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \quad ب \quad \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \quad أ$$

2- الدالة المعرفة على  $[0; +\infty]$  هي:  $h(x) = xe^x$ . القيمة المتوسطة للدالة  $h$  على المجال  $[0; 1]$  هي:

$$\mu = 0 \quad ج \quad \mu = e - 1 \quad ب \quad \mu = 1 \quad أ$$

3- تتكون مجموعة أشخاص من 8 رجال و 6 نساء، نريد تكوين 3 أشخاص رئيس و نائب و أمين عام ، عدد اللجان التي تضم رجال و امرأةان

الممكن الحصول عليها بحيث الرئيس أنثى هو:

$$360 \quad بـ 480 \quad ج 240$$

4- الشكل الأسوي لحلول المعادلة  $z + \sqrt{3}z + 1 = 0$  في مجموعة الأعداد المركبة هي

$$e^{\frac{2\pi i}{3}}; e^{\frac{4\pi i}{3}} \quad ج \quad e^{\frac{\pi i}{6}}; e^{\frac{7\pi i}{6}} \quad ب \quad e^{\frac{5\pi i}{6}}; e^{\frac{7\pi i}{6}} \quad أ$$

5 - حلول المعادلة التفاضلية  $y' + 3y + 6 = 0$  و الذي يحقق  $y(0) = 1$  هو الدالة  $h$  حيث:

$$h(x) = -3e^{-3x} + 4.$$

$$h(x) = 3e^{-3x} + 2.$$

$$h(x) = 3e^{-3x} - 2.$$

### التمرين الثالث: (04 نقاط)

يحتوي صندوق على ثلاثة أزهار نرد متوازنة ، اثنان منها خضراء واتنان وفيها ست أوجه مرقمة من 1 إلى 6 وأما الزهر الثالث فلونه أحمر وفيه وجهان يحملان الرقم 1 وأربعة أوجه تحمل الرقم 6.

نسحب من الصندوق بصفة عشوائية زهر نرد ثم نرميه مرة واحدة ونسجل الرقم الظاهر ، نعتبر الأحداث التالية :

$V$  : زهر النرد المسحوب أخضر ،  $R$  : زهر النرد المسحوب أحمر ،  $S$  : الرقم الظاهر هو 6 .

(1) أ translucent و أكمل شجرة الاحتمالات المقابلة

ب) بعد رمي زهر النرد كان الرقم الظاهر هو 6 ، ما احتمال أن يكون لونه أحمر ؟

ج) أحسب احتمال أن يكون زهر النرد أخضر علماً أنه يحمل رقم 1 .

2) ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بـ  $a$  - إذا كان الرقم الظاهر 6 و  $a$  إذا كان عكس ذلك .

أ) عين قيم المتغير العشوائي  $X$  .

ب) عرف قانون الاحتمال  $L_X$  ، وأحسب أمله الرياضي .

### التمرين الرابع: (07 نقاط)

أ) نعتبر الدالة العددية  $g$  المعرفة على  $[0; +\infty)$  كما يلي :

ولتكن  $(C_g)$  تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعمد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

$$A\left(1, \frac{1}{2}\right) \text{ عند النقطة } (C_g) \text{ (D) مماساً}$$

1. عين قيمتي  $a$  و  $b$  .

2. عين اتجاه تغيرات الدالة  $g$  واستنتج إشارة  $g(x)$  على المجال  $[0; +\infty)$  .

$$g(x) = \frac{1}{2}x^2 - \ln x$$

أ) نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $[0; +\infty)$  كما يلي :

ولتكن  $(C_f)$  تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعمد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. عين نهاية الدالة  $f$  عند  $0$  و  $+\infty$  .

2. ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$  ، ثم شكل جدول التغيرات .

3. أثبتت أن المستقيم  $(\Delta)$  ذو المعادلة  $y = x - 2$  مستقيم مقارب مائل للمنحنى  $(C_f)$  .

ب) حدد وضعية  $(C_f)$  بالنسبة إلى المستقيم  $(\Delta)$  في المجال  $[0; +\infty)$  .

د) أثبتت أنه توجد نقطة وحيدة  $B$  للمنحنى  $(C_f)$  يكون المماس  $(T)$  عندها موازي للمستقيم  $(\Delta)$  يطلب كتابة معادلة  $(T)$  .

4. أ) برهن أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  حيث:  $0,5 < \alpha < 0,6$  .

$$\text{ب) ارسم } (C_f) \text{ و } (\Delta) \text{ و } (T) \text{ ( } \|\vec{i}\| = 2\text{cm} ; \|\vec{j}\| = 1\text{cm} \text{ )}$$

ج) ناقش بيانياً حسب قيم العدد الحقيقي  $m$  عدد حلول المعادلة  $(m+1)x - 1 - \ln x = 0$  .

5. احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى  $(C)$  والمستقيمين اللذين معديلاهما  $1 = x$  و  $e = y$  .

6. نعتبر الدالة  $h$  المعرفة على  $R^*$   $h(x) = f(x^2)$  .

أ) اكتب  $h'(x)$  بدلالة  $f'(x)$  .

ب) شكل جدول تغيرات الدالة  $h$  .

انتهى الموضوع الأول

## الموضوع 02

### التمرين الأول: (04 نقاط)

نعتبر المتتالية  $(U_n)$  الهندسية حدودها موجبة حيث:  $4 = \ln(u_4) - \ln(u_2) = -12$  و  $1 = \ln(u_1) + \ln(u_5)$

(1) بين أن أساس المتتالية  $(U_n)$  هو  $q = \frac{1}{e^2}$  ثم عين حدتها الاولى  $u_0$ .

(2) احسب  $U_n$  بدلالة  $n$ .

(3) أ- احسب المجموع  $S_n = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$

ب- احسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ .

(4) لتكن المتتالية  $(V_n)$  المعرفة من اجل كل عدد طبيعي  $n$  بـ:  $V_n = \ln u_n + \ln u_{n+1}$

أ - بين أن  $(V_n)$  متتالية حسابية يطلب تعين أساسها.

ب - احسب المجموع  $S_n'$  حيث:  $S_n' = V_0 + V_1 + V_2 + \dots + V_n$

ت - هل توجد قيمة  $n$  حتى يكون  $S_n' = 2^{30}$  علـ ؟

### التمرين الثاني: (05 نقاط)

يحتوي صندوق على خمس كرات بيضاء مرقمة بـ: 1، 0، 0، 1، 1 وخمس كرات سوداء مرقمة بـ: 1، 1، 0، 1، 0. لانميـز بينـها باللمس ، نسحب عشوائـياً وفي آن واحد 3 كرات من الصندوق .

I. نعتبر الأحداث التالية :

$A$  : الحصول على كرة بيضاء واحدة فقط

$C$  : الكرات الثلاث المسحوبـة لها نفس اللون

$F$  : مجموع أرقام الكرات الثلاث المـسـحـوـبة يـساـوي 0

أحسب إحتمـالـ الأـحـدـاث  $A$  ،  $B$  و  $C$  .

.  $P(C \cap F) = \frac{7}{120}$  ،  $P(F) = \frac{31}{120}$  و  $P(D) = \frac{5}{6}$  1 - بين أن :

2 - إذا كان مجموع أرقام الكرات المـسـحـوـبة يـساـوي 0 ما هو إحتمـالـ أن تكون الكرات الثلاث من نفس اللون ؟

3 - المتغير العشوائي الذي يـرـفـقـ بـكـلـ سـحـبـ مـجمـوعـ الأـرـقـامـ المـتـحـصـلـ عـلـيـها

أـعـيـنـ قـيـمـ المتـغـيرـ العـشـوـائـيـ  $X$  .

بـ(عـيـنـ قـانـونـ الـاحـتمـالـ لـلـمـتـغـيرـ  $X$  ، أـحـسـبـ أـمـلـهـ الـرـيـاضـيـاتـيـ) .

جـ(استـنـجـ  $E(2X + 1)$ )

### التمرين الثالث: (04 نقاط)

المستوى المركب منسوب إلى معلم متعامـدـ وـ متـجـانـسـ مـباـشـرـ  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .

1. نضع  $z_3 = -1 - 2i$  ،  $z_2 = i\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)^3$  ،  $z_1 = \frac{-3+i}{1+i}$

أ. أكتب على الشكل الجـبـرـيـ كلـ منـ الأـعـدـادـ المـرـكـبـةـ  $z_1$  ،  $z_2$  .

بـ. أـحـسـبـ طـوـيـلـةـ كـلـ مـنـ الأـعـدـادـ  $z_1$  ،  $z_2$  و  $z_3$  .

2. نضع من أجل كل عدد مركب  $z$  :  $p(z) = z^3 + z^2 + 3z - 5$  :

أـ. أـحـسـبـ  $p(1)$  .

بـ. عـيـنـ العـدـدـيـنـ الـحـقـيقـيـيـنـ  $\alpha$  و  $\beta$  حيث:  $p(z) = (z - 1)(z^2 + \alpha z + \beta)$

تـ. حلـ فيـ  $\mathbb{C}$  ، مـجـمـوعـةـ الأـعـدـادـ الـمـرـكـبـةـ ، المعـادـلـةـ  $p(z) = 0$  .

3. لـتـكـنـ النـقـطـ  $A$  ،  $B$  و  $C$  الـيـلـواـحـقـهـاـ  $z_C = -1 - 2i$  ،  $z_A = -1 + 2i$  ،  $z_B = 1$  و  $i$

أنشئ في المعلم  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  النقط  $A$ ،  $B$  و  $C$ .

عين لاحقة النقطة  $A$  صورة  $D$  بواسطة تحاكي مركزه  $O$  ونسبة 3.

$$\frac{z_B - z_A}{z_B - z_C}$$

استنتج طبيعة المثلث  $ABC$ .

عين و انشئ مجموعة النقط  $M$  ذات الاحقة  $z$  التي تحقق:  $|z + 1 - 2i| = 3$ .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

ا/ نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على  $R$  بـ:  $g(x) = xe^x + 1$

ا/ احسب نهايتي الدالة  $g$  عند  $-\infty$  و  $+\infty$ .

ادرس اتجاه تغير الدالة  $g$  ثم شكل جدول اشارتها.

ب/ نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $R$  بـ:  $f(x) = x - \ln(xe^x + 1)$

ولتكن  $(C_f)$  تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. بين أنه من أجل كل  $x$  من  $R$  بـ:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\ln\left(x + \frac{1}{e^x}\right)$  ثم أحسب  $f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

2. ا/ بين أنه من كل  $x$  من  $R$  ،  $f'(x) = \frac{-e^x + 1}{g(x)}$  ثم استنتاج اتجاه تغير الدالة و شكل جدول تغيراتها.

3. ا) بين أن المستقيم  $(\Delta)$  ذو المعادلة  $x = y$  مقارب مائل للمنحنى  $(C_f)$  عند  $-\infty$ .

ب) ادرس وضعية المنحنى  $(C_f)$  بالنسبة للمستقيم  $(\Delta)$ .

ج) بين أن  $(C_f)$  يقبل مماسا  $(T)$  موازيا للمستقيم  $(\Delta)$  يطلب تعين معادلة له.

4. ا) بين أن المنحنى  $(C)$  الممثل للدالة  $x \mapsto -\ln(x)$  مقارب لـ  $(C_f)$  عند  $+\infty$ .

5. أحسب  $f(0)$  ثم أرسم  $(\Delta)$ ،  $(T)$  و المحنين  $(C)$  و  $(C_f)$  (حيث المنحنى  $(C_f)$  يقع فوق  $(C)$  من أجل  $[0; +\infty)$ ).

6. عين قيم الوسيط الحقيقي  $m$  حتى تكون للمعادلة:  $f(x) = x + |m|$  حلين مختلفين.

7. نعتبر الدالة  $k$  المعرفة على  $R$  بـ:  $k(x) = \frac{(-1 + x^2)e^x + x + 1}{xe^x + 1}$

ا) بين أنه من أجل كل  $x$  من  $R$  ،  $\int_0^{C_3^2} (k(x) - x) dx = -\ln(3 + e^{-3})$

ب) استنتاج  $A$  مساحة الحيز المحدد بالمنحنى  $(C_f)$  محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهما

$$x = 3 \text{ و } x = 0$$

حيث  $(C_f)$  منحنى الدالة  $f'$ .

انتهى الموضوع الثاني

كلنا أمل في تفوقكم

بالتوفيق في شهادة البكالوريا

$$\begin{aligned} \frac{2}{e} \left( 1 - \frac{1}{eu_n + 1} \right) &= \frac{2}{e} \left( \frac{eu_n + 1 - 1}{eu_n + 1} \right) \\ &= \frac{2}{e} \left( \frac{eu_n}{eu_n + 1} \right) = \frac{2u_n}{eu_n + 1} = u_{n+1} \end{aligned}$$

ب) برهان بالترافق أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$   $u_n > \frac{1}{e}$  :  $p(n)$  ...

$$u_0 = \frac{5}{4e} > \frac{1}{e} \quad n=0 \quad \text{ومنه} \quad p(n) \text{ من أجل } n=0 \quad \text{ومنه} \quad p(n+1)$$

ومنه  $p(n)$  محققة من أجل  $n=0$

نفرض صحة  $p(n)$  أي  $u_n > \frac{1}{e}$  ونبرهن صحة  $p(n+1)$  أي نبرهن

$$u_{n+1} > \frac{1}{e}$$

طريقة 1) من فرض  $eu_n + 1 > 1$  و منه  $eu_n > 0$  و منه  $eu_n + 1 > 2$  و منه

$$1 - \frac{1}{eu_n + 1} > \frac{1}{2} - \frac{1}{eu_n + 1} > -\frac{1}{2} \quad \text{و منه} \quad \frac{1}{eu_n + 1} < \frac{1}{2}$$

$$u_{n+1} > \frac{1}{e} \quad \text{أي} \quad \frac{2}{e} \left( 1 - \frac{1}{eu_n + 1} \right) > \frac{1}{e} \quad \text{و منه}$$

طريقة 2) من فرض  $u_n > \frac{1}{e}$  وبما أن  $f$  ممتزازة تماما على  $[0; +\infty)$  فإن

$$u_{n+1} > \frac{1}{e} \quad f(u_n) > f\left(\frac{1}{e}\right)$$

و منه حسب مبدأ الاستدلال بالترافق فإن  $u_n > \frac{1}{e}$  محققة من أجل كل

عدد طبيعي  $n$ .

ج) اثبات أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$   $u_{n+1} - u_n = \frac{eu_n \left( \frac{1}{e} - u_n \right)}{eu_n + 1} < 0$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n}{eu_n + 1} - u_n = \frac{2u_n - eu_n^2 - u_n}{eu_n + 1}$$

$$= \frac{u_n - eu_n^2}{eu_n + 1} = \frac{eu_n \left( \frac{1}{e} - u_n \right)}{eu_n + 1}$$

لدينا  $eu_n + 1 > 0$  و  $0 > \frac{1}{e} - u_n$  و منه  $u_n > \frac{1}{e}$   $u_{n+1} - u_n < 0$  أي

فإن المتالية  $(u_n)$  متناقصة تماما.

## الموضوع 01

التمرين الأول: (04 نقاط)

لتكن  $f$  الدالة المعرفة على المجال  $[0; +\infty)$  دالة اتجاه تغير الدالة  $f$  على المجال  $[0; +\infty)$

دالة معرفة وقابلة للاشتاقاق على  $[0; +\infty)$  و  $f'$  دالتها المشتقة معرفة

$$f'(x) = \frac{2(ex+1) - e2x}{(ex+1)^2} = \frac{2}{(ex+1)^2}$$


بما أن  $f'(x) > 0$  فإن الدالة  $f$  متزايدة تماما على  $[0; +\infty)$

$$\begin{cases} u_0 = \frac{5}{4e} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} \quad \text{نعتبر المتالية } (u_n) \text{ المعرفة على } \mathbb{N} \text{ بـ}$$

الشكل في الورقة المرفقة يمثل المنحنى  $(C)$  للدالة  $f$  على المجال

$y = x$  [0; +\infty) والمستقيم  $(D)$  الذي معادلته

(1) تمثل على محور الفواصل الحدود  $u_0, u_1, u_2, u_3$  دون حسابها مبرزا خطوط الرسم.



ب) تخمين حول إتجاه تغير المتالية  $(u_n)$  و تقاربها

بما أن  $u_3 > u_2 > u_1 > u_0$  فإن  $(u_n)$  متناقصة تماما ومتقدمة نحو

نقطة تقاطع  $(C)$  و  $(D)$  أي  $\frac{1}{e}$

$$u_{n+1} = \frac{2}{e} \left( 1 - \frac{1}{eu_n + 1} \right) : n$$

### التمرين الثاني : (50 نقاط)

لكل سؤال ثلاثة إجابات ، إجابة واحدة منها صحيحة ، المطلوب :

تحديد الإجابة الصحيحة مع التبرير

1. جذور العدد المركب  $i$  هي: الإجابة (ب)

التبير نضع  $i^2 = -1$  حيث  $w^2 = -i$  ومنه  $w = x + iy$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ 2xy = -1 \quad \text{أي} \quad x^2 - y^2 + 2xyi = -i \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

$$x = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{أو} \quad \begin{cases} 2x^2 = 1 & \dots(1) \\ 2xy = -1 & \dots(2) \end{cases}$$

$$x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{في المعادلة (2) فإن} \quad x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$y = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{في المعادلة (2) فإن} \quad x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

العدد المركب هي .2. الدالة المعرفة على  $[0; +\infty]$  . القيمة المتوسطة  $h(x) = xe^x$

للدالة  $h$  على المجال  $[0; 1]$  هي: الإجابة أ

$$\mu = \frac{1}{1-0} \int_0^1 xe^x dx$$

$$v'(x) = e^x \quad v(x) = e^x$$

$$= \int_0^1 xe^x dx \quad u(x) = x \quad u'(x) = 1$$

$$= xe^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx = (x-1)e^x \Big|_0^1 = 1$$

3. تتكون مجموعة أشخاص من 8 رجال و 6 نساء ، نريد تكوين 3 أشخاص رئيس و نائب و أمين عام ، عدد اللجان التي تضم رجل و امرأة الممكن

التحصل عليها بحيث الرئيس أنثى هو: الإجابة ب

التبير نضع الحادثة A ، عدد اللجان التي تضم رجل و امرأة الممكن

التحصل عليها بحيث الرئيس أنثى

$$|A| = 2A_6^2 \times A_8^1 = 2 \times 6 \times 5 \times 8 = 480$$

4. الشكل الأسي لحلول المعادلة  $z^2 + \sqrt{3}z + 1 = 0$  في مجموعة الأعداد

المركبة هي الإجابة أ

$$z^2 + \sqrt{3}z + 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = -1 = i^2$$

$$z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-\sqrt{3} + i}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} :$$

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-\sqrt{3} - i}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$$

$$|z_1| = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{-1}{2}\right)^2} = 1 \quad \text{لدينا} \quad z_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$$

بما أن المتتالية  $(u_n)$  متناقصة تماماً ومحدودة من الأسفل بـ  $\frac{1}{e}$  فإنها

متقاربة ..

(3) نعتبر المتتالية  $(v_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  بـ :

أ) ثبات  $v_n$  ممتاليه هندسيه أساسها 2 .

$$v_{n+1} = \frac{eu_{n+1}}{eu_{n+1} - 1} = \frac{eu_n + 1}{eu_n + 1 - 1} = \frac{eu_n + 1}{2eu_n - eu_n - 1} = \frac{2eu_n}{eu_n + 1} = 2v_n$$

فإن  $(v_n)$  ممتاليه هندسيه أساسها 5 و  $q = 2$

ب) عبر  $v_n$  عن بدلالة  $n$  :

$$v_n = \frac{eu_0}{eu_0 - 1} = 5 \quad \text{و} \quad eu_0 = 5 \times 2^n \quad \text{لدينا} \quad n \quad \text{بدلالة} \quad eu_n \quad \text{ومنه} \quad v_n = \frac{eu_n}{eu_n - 1}$$

$$(ev_n - e)u_n = v_n \quad \text{ومنه} \quad ev_n u_n - v_n = eu_n$$

$$u_n = \frac{5 \times 2^n}{e5 \times 2^n - e} = \frac{v_n}{ev_n - e}$$

حساب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{5 \times 2^n} = 0 \quad \text{لأن} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5 \times 2^n}{e5 \times 2^n - e} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5 \times 2^n}{5 \times 2^n \left( e - \frac{e}{5 \times 2^n} \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left( e - \frac{e}{5 \times 2^n} \right)} = \frac{1}{e}$$

ج) أحسب المجموع  $S_n$  بدلالة  $n$

$$w_n = \frac{1}{(eu_n - 1)^2} = \frac{1}{\left(\frac{ev_n - e}{ev_n - e - 1}\right)^2} \quad \text{ومنه} \quad w_n = \frac{1}{(eu_n - 1)^2}$$

$$= \left(\frac{ev_n - e}{e}\right)^2 = (v_n - 1)^2 = v_n^2 - 2v_n + 1$$

ومنه :

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{(eu_0 - 1)^2} + \frac{1}{(eu_1 - 1)^2} + \dots + \frac{1}{(eu_n - 1)^2} \\ &= w_0 + w_1 + \dots + w_n \\ &= (v_0^2 - 2v_0 + 1) + (v_1^2 - 2v_1 + 1) + \dots + (v_n^2 - 2v_n + 1) \\ &= (v_0^2 + v_1^2 + \dots + v_n^2) - 2(v_0 + v_1 + \dots + v_n) + 1 + 1 + \dots + 1 \\ &= 25 \left( \frac{4^{n+1} - 1}{4 - 1} \right) - 10 \left( \frac{2^{n+1} - 1}{2 - 1} \right) + n + 1 \\ &= \frac{25}{3} (4^{n+1} - 1) - 10 (2^{n+1} - 1) + n + 1 \end{aligned}$$

ب) بعد رمي زهر النرد كان الرقم الظاهر هو 6 ، حساب احتمال أن يكون لونه أحمر

$$p(S) = \frac{1}{6} \times \frac{2}{3} + \frac{4}{6} \times \frac{1}{3} = \frac{6}{18}$$

$$p_S(R) = \frac{p(S \cap R)}{p(S)} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{4}{6}}{\frac{6}{18}} = \frac{4}{6}$$

ج) حساب احتمال أن يكون زهر النرد أخضر علماً أنه يحمل رقم 1 .

$$p(\bar{S}) = \frac{5}{6} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{6} \times \frac{1}{3} = \frac{12}{18}$$

$$p_{\bar{S}}(V) = \frac{p(V \cap \bar{S})}{p(V)} = \frac{\frac{2}{3} \times \frac{10}{6}}{\frac{12}{18}} = \frac{10}{12}$$

2) ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بـ 2a- إذا كان الرقم الظاهر 6 و a إذا كان عكس ذلك .

$$I = \{-2a, a\} . X$$

ب) عرف قانون الاحتمال لـ  $X$  ،

$$p(x = -2a) = p(S) = \frac{6}{18}$$

$$p(x = a) = p(\bar{S}) = \frac{12}{18}$$

|              |                |                 |
|--------------|----------------|-----------------|
| $X_i$        | $-2a$          | $a$             |
| $p(X = X_i)$ | $\frac{6}{18}$ | $\frac{12}{18}$ |

حساب أمله الرياضياتي

$$E(X) = \sum_{i=1}^2 X_i p(X = X_i) = \frac{-12a}{18} + \frac{12a}{18} = 0$$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

أ/ نعتبر الدالة العددية  $g$  المعرفة على  $[0; +\infty)$  كما يلي :

$$g(x) = ax^2 + b \ln x$$

وليكن  $(C_g)$  تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعمد

$$(O; \vec{i}, \vec{j})$$

$$A\left(1, \frac{1}{2}\right) \text{ مماساً لـ } (C_g) \text{ عند النقطة } (D)$$

1. تعين قيمتي  $a$  و  $b$ .

لدينا  $(D)$  مماساً موازياً محور الفواصل لـ  $(C_g)$  عند النقطة

$$\begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -1 \end{cases} \quad \text{حيث } g'(x) = 2ax + \frac{b}{x} \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ 2a + b = 0 \end{cases} \quad \text{فإن} \quad \begin{cases} g(1) = \frac{1}{2} \\ g'(1) = 0 \end{cases}$$

2. عين اتجاه تغيرات الدالة  $g$ .

$$\arg z_1 = \pi + \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} \cos \theta_1 = \frac{x}{|z_1|} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta_1 = \frac{y}{|z_1|} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$z_1 = e^{\frac{7\pi}{6}i}$$

$$|z_2| = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = 1 \quad \text{ومنه} \quad z_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \quad \text{ولدينا}$$

$$\arg z_2 = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} \cos \theta_2 = \frac{x}{|z_2|} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta_2 = \frac{y}{|z_2|} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$z_2 = e^{\frac{5\pi}{6}i}$$

ومنه لشكل الأسني لحلول المعادلة  $\sqrt{3}z + 1 = 0$  في مجموعة الأعداد

$$e^{\frac{5\pi}{6}i}; e^{\frac{7\pi}{6}i}$$

5. حلول المعادلة التفاضلية  $y' + 3y + 6 = 0$  و الذي يحقق

$$y(0) = 1$$

$$\text{لدينا } y' = -3y - 6 \quad \text{ومنه} \quad y' + 3y + 6 = 0$$

$$y = ce^{-3x} - \frac{-6}{-3} = ce^{-3x} - 2$$

$$c = 3 \quad \text{لدينا } y(0) = 1 \quad \text{ومنه} \quad c - 2 = 1$$

إذن حلول المعادلة التفاضلية  $y' + 3y + 6 = 0$  و الذي يحقق


$$h(x) = 3e^{-3x} - 2 \quad \text{حيث } h(0) = 1$$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

نعتبر الأحداث التالية:  $V$  : زهر النرد المسحوب أخضر ،  $R$  : زهر النرد

المسحوب أحمر ،  $S$  : الرقم الظاهر هو 6 .

أ) الشجرة



أثبت أن المستقيم  $(\Delta)$  ذو المعادلة  $y = x - 2$  مستقيم مقارب مائل للمنحنى  $(C_f)$ .

لدينا :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2 + 2 \ln x}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2}{x} + \frac{2 \ln x}{x} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 2)] = 0$$

ومنه المستقيم  $(\Delta)$  مقارب مائل للمنحنى  $(C_f)$  عند  $+\infty$ .

ب) وضعية  $(C_f)$  بالنسبة إلى المستقيم  $(\Delta)$  في المجال  $[0; +\infty)$

$$f(x) - y = \frac{2 + 2 \ln x}{x} \cdot (f(x) - y) - y$$

جدول إشارة الفرق :

$$1 + \ln x = 0 \quad (2 + 2 \ln x) = 0 \quad f(x) - y = 0 \quad \text{ومنه} \quad 1 + \ln x = 0 \quad \text{أي}$$

$$x = e^{-1} \quad \ln x = -1$$

| $x$          | 0   | $e^{-1}$                   | $+\infty$ |
|--------------|---|----------------------------|-----------|
| $1 + \ln x$  | +   | 0                          | +         |
| $f(x) - y$   | -   | 0                          | +         |
| الوضع النسبي | ( $C_f$ ) تحت ( $\Delta$ )<br>قطع ( $C_f$ ) | ( $C_f$ )<br>فوق ( $C_f$ ) |           |

د) أثبت أنه توجد نقطة وحيدة  $B$  للمنحنى  $(C_f)$  يكون المماس  $(T)$  عندها موازي للمستقيم  $(\Delta)$

المماس  $(T)$  عندها موازي للمستقيمه  $(\Delta)$  معناه  $f'(x) = 1$  منه

$$\frac{x^2 - 2 \ln x}{x^2} = 1 \quad \text{ومنه} \quad x = 1 \quad \text{معادلة } (T) \text{ هي}$$

$$(T) : y = f'(x)(x - 1) + f(1)$$

$$y = x$$

برهان أن المعادلة  $y = x$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  حيث  $0.5 < \alpha < 0.6$

بيان أن المعادلة  $y = x$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  حيث  $0.5 < \alpha < 0.6$

لدينا  $f$  مستمرة ورتبة تماما على المجال  $[0.5; 0.6]$

ولدينا:  $f(0.5) < 0 < f(0.6)$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة  $0 = f(x)$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  حيث  $0.5 < \alpha < 0.6$

ب) رسم  $(C_f)$  و  $(\Delta)$  (رسم  $(C_f)$  و  $(\Delta)$ )

إشارة  $(x)$  على المجال  $[0; +\infty)$  لدينا  $\frac{1}{2}$  قيمة حدية صغرى ومنه متناظصة تماما على  $[0; +\infty)$  و متزايدة تماما على  $[0; +\infty)$

$$g(x) \geq \frac{1}{2} \quad \text{أي } g(x) > 0 \quad \text{فإن موجبة على } [0; +\infty)$$

$$g(x) = \frac{1}{2}x^2 - \ln x$$

II / نعتبر الدالة العددية  $f$  المعروفة على  $[0; +\infty)$  كما يلي:

$$f(x) = x - 2 + \frac{2 + 2 \ln x}{x}$$

و تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. عين نهاية الدالة  $f$  عند  $0$  و  $+\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( x - 2 + \frac{2 + 2 \ln x}{x} \right) = -\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} (2 + 2 \ln x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{1}{x} \right) = +\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( x - 2 + \frac{2 + 2 \ln x}{x} \right) = +\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2}{x} \right) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2) = +\infty \end{cases}$$

2. ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$ , ثم شكل جدول التغيرات.

دالة معروفة وقابلة للاشتاقاق على  $[0; +\infty)$  و  $f'$  دالتها المشتقة

$$f'(x) = 1 + \left[ \frac{\frac{2}{x} \times x - (2 + 2 \ln x)}{x^2} \right] \quad \text{لدينا:}$$

$$= 1 + \left[ \frac{2 - (2 + 2 \ln x)}{x^2} \right] = \frac{x^2 - 2 \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{2 \left( \frac{1}{2}x^2 - \ln x \right)}{x^2} = \frac{2g(x)}{x^2}$$

استنتاج اتجاه تغير الدالة  $f$ : بما أن  $0 < g(x) < 0$  فإن  $f'(x) < 0$

بما أن  $0 < f'(x) < 0$  فإن  $f$  متزايدة تماما على  $[0; +\infty)$

جدول تغيرات الدالة  $f$ :

| $x$     | 0         | $+\infty$ |
|---------|-----------|-----------|
| $f'(x)$ | +         |           |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $+\infty$ |

6 . نعتبر الدالة  $h(x) = f(x^2)$  المعرفة على  $R^*$

$$f'(x) \text{ بدلالة } h'(x) \text{ (أ)}$$

$$h'(x) = 2xf'(x^2)$$

• النهايات

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2) = 0^+ \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \end{cases} \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x^2) = -\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2) = 0^+ \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \end{cases} \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x^2) = -\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \end{cases} \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2) = +\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \end{cases} \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2) = +\infty$$

• دراسة اتجاه تغير الدالة

لدينا  $0 < x < 0$   $f'(x) > 0$  من أجل

أي لدينا  $0 < x^2 < 0$  أي  $f'(x^2) > 0$  من أجل

$$x \in ]-\infty; 0[ \cup ]0; +\infty[$$


ومنه أشارة  $h'(x)$  من أشارة

أي من أجل  $x \in ]0; +\infty[$   $h'(x) > 0$  فإن  $h(x)$  متزايدة تماماً على  $[0; +\infty[$

و من أجل  $x \in ]-\infty; 0[$   $h'(x) < 0$  فإن  $h(x)$  متناقصة تماماً على  $]-\infty; 0[$

ب) جدول تغيرات الدالة .

| $x$     | $-\infty$                 | $0$       | $+\infty$   |
|---------|---------------------------|-----------|-------------|
| $h'(x)$ | —                         |           | +           |
| $h(x)$  | $+\infty$ ↘<br>— $\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ ↘ |



ج) مناقشة بيانية حسب قيم العدد الحقيقي  $m$  عدد حلول المعادلة

$$(m+1)x - 1 - \ln x = 0$$

$$mx + x - 1 - \ln x = 0 \quad (m+1)x - 1 - \ln x = 0 \quad \text{معناه}$$

$$-2x + 2 + 2\ln x = 2mx - x + 1 + \ln x = mx \quad \text{ومنه}$$

$$\frac{2 + 2\ln x}{x} = x + 2m - 2 + \frac{2 + 2\ln x}{x} = 2m \quad \text{ومنه} \quad x - 2 +$$

$$f(x) = x + 2m$$

حلول المعادلة  $f(x) = x + 2m$  هي فواصل نقط تقاطع ( $C_f$ ) مع

$$\text{المستقيم } y_m = x + 2m \quad \text{ذو المعادلة } (\Delta_m)$$

| العدد        | $m$             | $2m$            |
|--------------|-----------------|-----------------|
| حل وحيد      | $]-\infty; -1[$ | $]-\infty; -2[$ |
| حلين مختلفين | $] -1; 0[$      | $] -2; 0[$      |
| حل وحيد      | 0               | 0               |
| لا يوجد حل   | $]0; +\infty[$  | $]0; +\infty[$  |

5. احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحني ( $C$ ) والمستقيم

.  $x = e$  و  $x = 1$  و  $y = x - 2$  (D) والمستقيمين اللذين معدلتاهما

$$\begin{aligned} A &= \int_1^e |f(x) - y| dx \|\vec{i}\| \|\vec{j}\| \\ &= \int_1^e \left( \frac{2 + 2\ln x}{x} \right) dx \|\vec{i}\| \|\vec{j}\| \\ &= \int_1^e \left( \frac{2}{x} + \frac{2 + 2\ln x}{x} \right) dx \|\vec{i}\| \|\vec{j}\| \\ &= \left[ 2\ln|x| + (\ln|x|)^2 \right]_1^e \|\vec{i}\| \|\vec{j}\| = 6cm^2 \end{aligned}$$

## الموضوع 02

### التمرين الأول : (04 نقاط)

نعتبر المتتالية  $(U_n)$  الهندسية حدودها موجبة حيث :

$$\begin{cases} \ln(u_2) - \ln(u_4) = 4 & \dots \dots (1) \\ \ln(u_1) + \ln(u_5) = -12 & \dots \dots (2) \end{cases}$$

1. أثبات أن أساس المتتالية  $(U_n)$  هو  $q = \frac{1}{e^2}$

لدينا  $u_4 = u_2 q^2$  وبتعويض في المعادلة (1) نجد

$$\ln\left(\frac{1}{q^2}\right) = 4 \text{ ومنه } \ln\left(\frac{u_2}{u_2 q^2}\right) = 4 \text{ أي } \ln(u_2) - \ln(u_2 q^2) = 4$$

$$(U_n) \text{ مرفوض لأن } q = \frac{1}{e^2} \text{ ومنه } q^2 = \frac{1}{e^4} \text{ ومنه } \frac{1}{q^2} = e^4$$

حدودها موجبة ومنه  $q = \frac{1}{e^2}$  تعين حدها  $u_0$

لدينا  $u_5 = u_0 q^5$  و  $u_1 = u_0 q$  وبتعويض في المعادلة (2) نجد

$$\ln(u_0 q^6) = -12 \text{ ومنه } \ln(u_0 q) + \ln(u_0 q^5) = -12$$

$$u_0 = -1 \text{ أو } u_0 = 1 \text{ أي } u_0^2 = 1 \text{ ومنه } u_0^2 e^{-12} = e^{-12} \text{ ومنه } u_0^2 q^6 = e^{-12}$$

$$\text{مرفوض لأن لأن } (U_n) \text{ حدودها موجبة ومنه } u_0 = 1$$

1.2 احسب  $U_n$  بدلالة  $n$

$$u_n = u_0 q^n = e^{-2n}$$

1.3 احسب المجموع  $S_n = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$

$$S_n = u_0 \left( \frac{1 - (q)^{n+1}}{1 - q} \right) = \left( \frac{1 - (e^{-2})^{n+1}}{1 - e^{-2}} \right)$$

1.4 احسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1 - (e^{-2})^{n+1}}{1 - e^{-2}} \right) = \frac{1}{1 - e^{-2}}$$

$$0 < e^{-2} < 1 ; \lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{-2})^{n+1} = 0$$

4. لتكن المتتالية  $(V_n)$  المعرفة من أجل كل عدد طبيعي  $n$  بـ :

$$V_n = \ln u_n + \ln u_{n+1}$$

أ - بين أن  $(V_n)$  ممتالية حسابية يطلب تعين أساسها.

$$v_{n+1} - v_n = \ln u_{n+1} + \ln u_{n+2} - (\ln u_n + \ln u_{n+1})$$

$$= \ln u_{n+2} - \ln u_n = \ln(e^{-2(n+2)}) - \ln e^{-2n}$$

$$= -2n - 4 + 2n = -4$$

ومنه  $(V_n)$  ممتالية حسابية و  $r = -4$  و  $v_0 = \ln u_0 + \ln u_1 = -2$

ب - احسب المجموع  $S_n$  حيث :

$$S_n = V_0 + V_1 + V_2 + \dots + V_n$$

$$S_n = \frac{n+1}{2} (v_0 + v_n) = \frac{n+1}{2} (-2 - 4n - 2) = -2(n+1)^2$$

لا توجد قيمة لـ  $n$  بحيث  $S_n = 2^{30}$  لأن  $S_n < 0$

### التمرين الثاني : (05 نقاط)

يحتوي صندوق على خمس كرات بيضاء مرقمة بـ 1، 1، 0، 1، 1 - وخمس كرات سوداء مرقمة بـ 0، 0، 1، 1، 0 - لانميز بينها باللمس ، نسحب عشوائياً في آن واحد 3 كرات من الصندوق .

حساب إحتمال الأحداث  $A$  ،  $B$  و  $C$  .

$$|\Omega| = C_{10}^3 = \frac{10!}{3!7!} = 120$$

$$A = \{(B, N, N)\}$$

$A$  : الحصول على كرة بيضاء واحدة فقط

$$p(A) = \frac{C_5^1 C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{50}{120} = \frac{5}{12}$$

$B$  : الحصول على كرتين بيضاء على الأقل

$$B = \{(B, N, N); (B, B, N); (B, B, B)\}$$

$$p(B) = \frac{C_5^1 C_5^2 + C_5^2 C_5^1 + C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{110}{120} = \frac{11}{12}$$

$C$  : الكرات الثلاث المسحوبة لها نفس اللون

$$C = \{(N, N, N); (B, B, B)\}$$

$$p(C) = \frac{C_5^3 + C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}$$

$D$  : الحصول على اللوين الأبيض والأسود

$$D = \{(B, N, N); (B, B, N)\}$$

$$p(D) = \frac{C_5^1 C_5^2 + C_5^1 C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{100}{120} = \frac{5}{6}$$

$$p(D) = 1 - p(C) = \frac{5}{6}$$

$F$  : مجموع أرقام الكرات الثلاث المسحوبة يساوي 0

$$F = \{(0, 0, 0); (-1, 0, 1)\}$$

$$p(F) = \frac{C_3^3 + C_2^1 C_3^1 C_5^1}{C_{10}^3} = \frac{31}{120}$$

$C \cap F$  : مجموع الكرات المسحوبة معدوم وفي من نفس لون

$$C \cap F = \{(B_0, B_1, B_{-1}); (N_0, N_1, N_{-1})\}$$

$$p(C \cap F) = \frac{C_1^1 C_3^1 C_1^1 + C_1^1 C_2^1 C_2^1}{C_{10}^3} = \frac{7}{120}$$

حساب إحتمال أن تكون الكرات الثلاث من نفس اللون علماً أن

مجموع أرقام الكرات المسحوبة يساوي 0

$$p_F(C) = \frac{p(C \cap F)}{p(F)} = \frac{\frac{7}{120}}{\frac{31}{120}} = \frac{7}{31}$$

$X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب مجموع الأرقام المتحصل عليها

2. نضع من أجل كل عدد مركب  $z$  :

$$p(1) = 1 \cdot p(1)$$

ب. عين العدددين الحقيقيين  $\alpha$  و  $\beta$  حيث :

$$p(z) = (z-1)(z^2 + \alpha z + \beta)$$

$$(z-1)(z^2 + \alpha z + \beta)$$

$$\begin{aligned} \text{لدينا} \quad &= z^3 + z^2(\alpha - 1) + z(\beta - \alpha) - \beta \\ \text{ومنه بالتطابقة} \quad &= p(z) \end{aligned}$$

$$\beta = 5 \quad \alpha = 2 \quad \text{نجد}$$

ج. حل في  $\mathbb{C}$  ، مجموعة الأعداد المركبة ، المعادلة

$$(z-1)(z^2 + 2z + 5) = 0 \quad p(z) = 0$$

$$z-1=0 \quad z^2 + 2z + 5 = 0$$

$$\{-1 + 2i, -1 - 2i, 1\} \quad p(z) = 0$$

3. لتكن النقط  $A$  ،  $B$  ،  $C$  و  $D$  التي لواحقها  $z_B = 1$  ،  $z_A = -1 + 2i$  و  $z_C = -1 - 2i$  و

أنشئ في المعلم  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  النقط  $A$  ،  $B$  و  $C$  .

النقطة  $D$  صورة  $A$  بواسطة تحاكي مركزه  $O$  ونسبة 3 .

$$z_D = 3z_A = 3(-1 + 2i) = -3 + 6i \quad z_D - z_o = 3(z_A - z_o) \quad \text{معناه} \\ \text{ومنه} \quad D(3; 6)$$

$$\frac{z_B - z_A}{z_B - z_C} \quad \text{احسب} \quad \bullet$$

$$\frac{z_B - z_A}{z_B - z_C} = \frac{1 - (-1 + 2i)}{1 - (-1 - 2i)} = \frac{(2 - 2i)(2 - 2i)}{(2 + 2i)(2 - 2i)} = -i$$

استنتج طبيعة المثلث  $ABC$  .

$$AB = BC \quad \text{أي} \quad \left| \frac{z_B - z_A}{z_B - z_C} \right| = |-i| = 1 \quad \text{لدينا} \\ \text{متساوي الساقين} \quad (1)$$

$$\arg \left( \frac{z_B - z_A}{z_B - z_C} \right) = \arg(-i) = -\frac{\pi}{2} \quad \text{ولدينا}$$

$$\left( \overrightarrow{CB}; \overrightarrow{AB} \right) = -\frac{\pi}{2} \quad \text{ومنه المثلث } ABC \text{ قائم} \quad (2)$$

من (1) و (2) نستنتج أن  $ABC$  مثلث قائم و متساوي الساقين في  $A$  .  
تعين مجموعة النقط  $M$  ذات اللاحقة  $z$  التي تحقق :

$$|z + 1 - 2i| = 3$$

$$|z - (-1 + 2i)| = 3 \quad \text{معناه} \quad |z + 1 - 2i| = 3$$

$$AM = 3 \quad \text{ومنه} \quad |z - z_A| = 3$$

ومنه مجموعة النقط هي دائرة مركزها  $A$  و نصف قطرها 3

قيم و قانون المتغير العشوائي  $X$

$$I = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

$$p(x = -2) = \frac{C_2^2 C_3^1}{C_{10}^3} = \frac{3}{120} \quad \longleftrightarrow \quad x = -2 \longleftrightarrow \{-1, -1, 0\}$$

$$p(x = -1) = \frac{C_2^1 C_3^2 + C_2^2 C_3^1}{C_{10}^3} = \frac{11}{120} \longleftrightarrow x = -1 \longleftrightarrow \{-1, 0, 0\}(-1, -1, 1)\}$$

$$p(x = 0) = p(F) = \frac{31}{120} \quad \longleftrightarrow x = 0 \longleftrightarrow \{(0, 0, 0)(-1, 0, 1)\}$$

$$p(x = 1) = \frac{C_5^1 C_3^2 + C_5^2 C_3^1}{C_{10}^3} = \frac{35}{120} \longleftrightarrow x = 1 \longleftrightarrow \{(1, 0, 0)(-1, 1, 1)\}$$

$$p(x = 2) = \frac{C_3^1 C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{30}{120} \quad \longleftrightarrow x = 2 \longleftrightarrow \{(1, 1, 0)\}$$

$$p(x = 3) = \frac{C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{10}{120} \quad \longleftrightarrow x = 3 \longleftrightarrow \{(1, 1, 1)\}$$

| $x_i$        | -2              | -1               | 0                | 1                | 2                | 3                |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| $p(x = x_i)$ | $\frac{3}{120}$ | $\frac{11}{120}$ | $\frac{31}{120}$ | $\frac{35}{120}$ | $\frac{30}{120}$ | $\frac{10}{120}$ |

أحسب أمله الرياضي .

$$E(X) = \sum_{i=1}^6 x_i p(x = x_i) = \frac{9}{10}$$

$$E(2X + 1) = 2E(X) + 1 = \frac{14}{5}$$

التمرين الثالث : (04 نقاط)

المستوى المركب منسوب إلى معلم متعمد و متجانس مباشر  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .

$$z_3 = -1 - 2i \quad z_2 = i \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right)^3, \quad z_1 = \frac{-3 + i}{1 + i}$$

أ. الشكل الجبري للأعداد المركبة  $z_1$  ،  $z_2$  ،  $z_3$  .

$$z_1 = \frac{(-3 + i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{-3 + 3i + i + 1}{1 + 1} = \frac{-2 + 4i}{2} = -1 + 2i$$

$$z_2 = i \left( \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right)^3$$

$$= i \left( \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^3 + 3 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 \left( -\frac{i}{2} \right) + 3 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left( -\frac{i}{2} \right)^2 + \left( -\frac{i}{2} \right)^3 \right)$$

$$= i \left( \frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{9i}{8} - \frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{i}{8} \right) = i(-i) = 1$$

ب. حساب طولية الأعداد  $z_1$  ،  $z_2$  و  $z_3$  .

$$|z_1| = |-1 + 2i| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$|z_2| = |1| = 1$$

$$|z_3| = |-1 - 2i| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$$

$$f'(x) = \frac{-e^x + 1}{g(x)}, \quad x \in R$$

1.2- اثبات أنه من كل  $x$  من  $R$  دالة  $f$  للاشتاقاق على  $R$  و  $f'$  دالتها المشتقة

$$f'(x) = 1 - \frac{(xe^x + 1)'}{xe^x + 1} = \frac{xe^x + 1 - e^x - xe^x}{xe^x + 1}$$

$$= \frac{1 - e^x}{xe^x + 1} = \frac{1 - e^x}{g(x)}$$

إشاره  $f'(x) > 0$  لأن  $e^x - 1 < 0$  من اشاره  $f$

|         |           |   |           |
|---------|-----------|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0 | -         |

أي من أجل  $x \in ]0; +\infty[$  ومنه  $f'(x) < 0$  دالة  $f$  متناقصة تماما على  $]0; +\infty[$

ومن أجل  $x \in ]-\infty; 0[$  ومنه  $f'(x) > 0$  دالة  $f$  متزايدة تماما على  $]-\infty; 0[$

جدول تغيراتها .

|         |           |   |           |
|---------|-----------|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +         | 0 | -         |
| $f(x)$  | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |

3. اثبات أن المستقيم  $(\Delta)$  ذو المعادلة  $y = x$  مقارب مائل للمنحنى  $(C_f)$  عند  $-\infty$  .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - \ln(xe^x + 1) - x) = 0$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x + 1) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(xe^x + 1) = 0 \end{cases}$$

ب) دراسة وضعية المنحنى  $(C_f)$  بالنسبة للمستقيم .

$$\begin{aligned} \text{أي } xe^x = 0 \text{ ومنه } xe^x + 1 = 1 = \ln(xe^x + 1) \text{ ومنه } \\ x = 0 \end{aligned}$$

|              |                             |                              |                             |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| $x$          | $-\infty$                   | 0                            | $+\infty$                   |
| $f(x) - x$   | +                           | 0                            | -                           |
| الوضع النسبي | فوق $(C_f)$<br>( $\Delta$ ) | يقطع $(C_f)$<br>( $\Delta$ ) | تحت $(C_f)$<br>( $\Delta$ ) |

ج) اثبات أن  $(C_f)$  يقبل مماسا  $(T)$  موازيا للمستقيم  $(\Delta)$

$$\frac{1 - e^x - xe^x - 1}{xe^x + 1} = 0 \quad \text{ومنه } \frac{1 - e^x}{xe^x + 1} - 1 = 0 \quad \text{معناه } f'(x) = 1$$

$$x = -1 - x = 0 \quad \text{ومنه } -1 - \frac{(-1 - x)e^x}{xe^x + 1} = 0$$

$$(T) : y = f'(-1)(x + 1) + f(-1)$$

$$y = x + 1 - \ln(-1 + e)$$

## التمرين الرابع: (07 نقاط)

نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على  $R$  بـ:

• حساب نهايتي الدالة  $g$  عند  $-\infty$  و  $+\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^x + 1 = +\infty$$

$$\left\{ \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x) = 0 \quad \text{لأن} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x + 1 = 1 \right.$$

• دراسة اتجاه تغير الدالة  $g$

دالة  $g$  معرفة وقابلة للاشتاقاق على  $R$  و  $g'$  دالتها المشتقة معرفة بـ

$$g'(x) = e^x + xe^x = (x + 1)e^x$$

$x = 0$  معناه  $g'(x) = 0$

|         |           |    |           |
|---------|-----------|----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | -1 | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | -         | 0  | +         |

أي من أجل  $x \in ]-1; +\infty[$  فإن  $g'(x) > 0$  ومنه  $g$  متزايدة تماما على  $] -1; +\infty[$

ومن أجل  $x \in ]-\infty; -1[$  فإن  $g'(x) < 0$  ومنه  $g$  متناقصة تماما على  $] -\infty; -1[$

|         |           |         |           |
|---------|-----------|---------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | -1      | $+\infty$ |
| $g'(x)$ | -         | 0       | +         |
| $g(x)$  | 1         | $g(-1)$ | $+\infty$ |

بما أن  $g(-1) \leq g(x) \leq g(1)$  قيمة حدية صغرى فإن  $g(-1) < 0$  ومنه  $g$  موجبة تماما على  $R$

II/ نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $R$  بـ:

ولتكن  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس

$$f(x) = -\ln\left(x + \frac{1}{e^x}\right) \quad \text{بـ: } R$$

$$-\ln\left(x + \frac{1}{e^x}\right) = -\ln\left(\frac{xe^x + 1}{e^x}\right)$$

$$= -\left[\ln(xe^x + 1) - \ln(e^x)\right]$$

$$= -\ln(xe^x + 1) + x = f(x)$$

حساب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\ln\left(x + \frac{1}{e^x}\right) = -\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \frac{1}{e^x}\right) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} -\ln(xe^x + 1) = -\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x - \ln(xe^x + 1)\right) = -\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x + 1) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(xe^x + 1) = 0 \end{cases}$$

6. تعين قيم الوسيط الحقيقي  $m$  حتى تكون للمعادلة  $f(x) = x + |m|$  حلين مختلفين.

المعادلة:  $f(x) = x + |m|$  حلين مختلفين من أجل  $]-1 + \ln(-1 + e); 1 - \ln(-1 + e)[$  أي  $|m| < 1 - \ln(-1 + e)$

7. نعتبر الدالة  $k$  المعرفة على  $R$  بـ

$$k(x) = \frac{(-1 + x^2)e^x + x + 1}{xe^x + 1}$$

(أثبات أنه من أجل كل  $x$  من  $0^2$  إلى  $3$ )  $\int_0^3 (k(x) - x) dx = -\ln(3 + e^{-3})$  ،  $R$

$$\begin{aligned} \int_0^3 (k(x) - x) dx &= \int_0^3 \left( \frac{(-1 + x^2)e^x + x + 1 - xe^x - 1}{xe^x + 1} \right) dx \\ &= \int_0^3 f'(x) dx = [f(x)]_0^3 = -\ln(3 + e^{-3}) \end{aligned}$$

ب) ستنتاج  $A$  مساحة الحيز المحدد بالمنحنى  $(C_f)$  محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهما  $x = 0$  و  $x = 3$

$$\int_0^3 |f'(x)| dx = -\int_0^3 f'(x) dx = -[f(x)]_0^3 = \ln(3 + e^{-3})$$

4. أثبات أن المنحنى  $(C_f)$  الممثل للدالة  $x \mapsto -\ln(x)$  مقارب له عند  $+\infty$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + \ln x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \ln x - \ln \left( \frac{xe^x + 1}{e^x} \right) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \ln \left( \frac{xe^x}{xe^x + 1} \right) \right) = 0 \end{aligned}$$

ثم أرسم  $f(0) = 0$  .  $(C_f)$  و  $(T)$  ،  $(\Delta)$  و  $(\Delta)$  المنحنيين

