




على المترشح ان يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول

التمرين الأول: (05 نقاط)

تتميز النباتات الخضراء بقدرتها على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية انطلاقاً من الكربون المعدني في وجود الضوء ضمن عملية التركيب الضوئي وفق مراحلتين، إلا أنه يمكن لبعض المركبات الكيميائية أن تؤثر على هذه العملية كمبادرات الأعشاب الضارة لإيقاف نموها. تمثل الوثيقة التالية مراحل هذه العملية وتأثير بعض المبيدات عليها:



1- أجب بـ "صحيح" أو خطأ مع تصحيح الإجابات الخاطئة:

- أ- في غياب الضوء يكون انتقال الالكترونات غير ممكناً بين جميع عناصر سلسة النقل الالكترونات.
- ب- يسمح الضوء بانتقال الالكترونات من الماء ذو كمون اكسدة و ارجاع مرتفع إلى (NADP+) ذو كمون اكسدة و ارجاع منخفض.
- ت- يستعمل الناقل (T₁+T₂) الطاقة على شكل (ATP) لاضخ البروتونات عكس تدرج في التركيز .
- ث- يتطلب الفسفرة الضوئية على مستوى ATP سنتاز (الكريمة المذنبة) الطافة .


- 2- اشرح في نص علمي الآلية المؤدية إلى تحويل الطاقة الضوئية لطاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية مبيناً تأثير المبيد A و B عليهما، انطلاقاً من معطيات الوثيقة و معلوماتك.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

في إطار البحث عن علاجات للأورام السرطانية، وجد أن إستهداف آليات إنتاج بعض الجزيئات الضرورية لتركيب البروتين باستعمال مضادات حيوية كالأوليغوميسين قد أثبتت فعاليته في علاج كثير من هذه الأورام، فكيف ذلك؟

الجزء الأول:

- لإظهار تأثير المضاد الحيوي "الأوليغوميسين" نقدم لك الدراسة التالية:
- تم متابعة نمو حجم أورام سرطانية مستحدثة لدى مجموعتين من الفئران إحداهما معالجة بالأوليغوميسين والأخرى شاهدة، النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).
 - باستغلال تقنيات خاصة، تم متابعة نسبة تركيب ATP من طرف ميتوكوندريات خلية بنكرياسية وكذا كمية البروتين المصنعة بعد حضن هذه الخلية في وسط زجاجي به أحماض أمينية مشعة، وذلك في تراكيز مختلفة من المضاد الحيوي، النتائج ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (1).



1- حل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- برأك استعمال الأوليغوميسين في معالجة الأورام السرطانية، باستغلالك لشكل (ب) من الوثيقة (1).


الجزء الثاني :

لفهم آلية تأثير الأوليغوميسين نقدم الدراسة التالية:

- تم تجزئة الغشاء الداخلي للميتوكوندري حيث يشكل حويصلات تتجه فيها الكريات المذنبة نحو الخارج وتسعمل هذه الحويصلات في دراسة تجريبية، الشكل (أ) من الوثيقة (2) يترجم هذه الدراسة ونتائجها.
- الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح تأثير الأوليغوميسين على المستوى الجزيئي.

النتائج التجريبية		الشروط التجريبية			بنية الحويصلات
نشاط إنزيم ATP	تركيب ATP	PH الوسط الداخلي	PH الوسط الخارجي	الأوليغوميسين	
% 0	-	7	7	غياب	
%100	+++++	4	8	غياب	
%10	+	4	8	وجود	

الشكل (أ)



الأوليغوميسين

الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- اشرح آلية تأثير الأوليغوميسين في معالجة الأورام السرطانية، باستغلالك لشكلك لشكل (أ) الوثيقة (2).

التمرين الثالث: (08 نقاط)

يعتبر النشاط الإنزيمي مظهر من مظاهر التخصص الوظيفي للبروتينات والذي يرتبط أساساً ببنائه الفراغية ، إلا أن الإنزيمات تتأثر سلباً وإيجاباً بعوامل مختلفة وإظهار ذلك نقترح الدراسة التالية :

الجزء الأول:

يعتبر إنزيم **RUBISCO** (ريبيولوز 1,5-ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز/أوكسجيناز) الأكثر وفرة على الأرض إذ يشارك في الخطوة الرئيسية لبناء السكريات مثل الجلوكوز عند النباتات والكائنات العضوية وذلك عن طريق تثبيت CO_2 المتواجد في الجو على الريبيولوز 1,5-ثنائي الفوسفات (**RUDP**)

وفق المعادلة التالية:




لدراسة تأثير عاز ثنائي الأكسجين O_2 على نشاط هذا الإنزيم تم اجراء سلسلة من التجارب كما يلي:

تجربة 01: تم دراسة تغيرات دمج غاز CO_2 المقاس على أوراق البازلاء بدرجة حرارة الاوراق حيث تزرع النباتات في ضوء عند درجة الحرارة 20 ± 2 درجة مئوية في تركيزين مختلفين من O_2 ، مع العلم أن درجة الحرارة فوق 30 درجة مئوية تؤدي الى انغلاق الثغور الورقية النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة(1).

تجربة 02: في نفس الوقت تم دراسة نشاط انزيم RUBISCO من خلال قياس كمية APG الناتجة بدلالة درجة حرارة الأوراق النتائج مماثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (1).

تجربة 03: تم قياس كمية APG بدلالة تركيز مادة التفاعل RUDP في وجود CO_2 و O_2 النتائج موضحة في الشكل (ج) من الوثيقة (01).




- أبرز المشكل العلمي المطروح ثم اقترح فرضية تفسيرية لحله باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

للمصادقة على صحة الفرضية المقترحة والاجابة عن المشكل العلمي نقدم الدراسة التالية:

تمثل الوثيقة (2) رسم تخطيطي يوضح عمل انزيم RUBISCO في وجود O_2 و CO_2 . بينما الوثيقة (3) تمثل نماذج مأخوذة ببرنامجه الراستبول لبنيه الموقعي التحفيزي لإنزيم RUBISCO في وجود O_2 و CO_2 .



- 1- بين تأثير الأكسجين على نشاط إنزيم RUBISCO مبرزاً الخاصية المميزة للإنزيم، مصادقاً على صحة الفرضية المقترنة باستغلالك للوثائقتين (2) و(3).
 - 2- اقترح حل للتقليل من تأثير الأكسجين على عمل إنزيم RUBISCO.
- الجزء الثالث:**

وضوح في حصيلة تركيبية أهمية البنية الفراغية للإنزيمات في اكتسابها تخصصها الوظيفي مبرزاً تأثير العوامل الخارجية على إنزيم RUBISCO انطلاقاً مما توصلت إليه ومكتسباته.


إنتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني :

التمرين الأول: (05 نقاط)

يرتكز التخصص الوظيفي للبروتينات على بنيتها الفراغية مثل إنزيم الأسبارجيناز L-Asparaginase المسؤول عن تحويل حمض الأسبارгин إلى حمض الأسبارتيك على مستوى خلايا العضوية. زيادة تركيز نيتروجين اليوريا Urea Nitrogen المحرر من طرف خلايا الكبد كفضلات ناتجة من هدم بروتينات الأطعمة المتناوله والتي تعمل على كسر الروابط الهيدروجينية (H) في مستويات مختلفة تسمح بفقدان إنزيم الأسبارجيناز تخصصه الوظيفي فيظهر مرض سرطان إيضاخ الدم الحاد المتعلق بالنخاع الشوكي.

ملاحظة: حمض الأسبارجين يساعد الخلايا السرطانية على صناعة مادتها الوراثية.



1- أكتب الصيغة الشاردية للأحماض الأمينية لموقع التحفيز ضمن السلسلة البيتايدية عند (1 و 13 pH =) .

2- اشرح في نص علمي كيف تساهم التراكيز المرتفعة من مادة نيتروجين اليوريا المحررة على مستوى الكبد بالإصابة بمرض سرطان إيضاخ الدم الحاد المتعلق بالنخاع الشوكي .


التمرين الثاني: (07 نقاط)

تؤدي البروتينات الدفاعية للجهاز المناعي أدوار مهمة في إقصاء اللادات وضمان سلامة العضوية، إلا أن حدوث بعض الاضطرابات النفسية كالتوتر والخوف يؤثر على هذه البروتينات و يجعل العضوية عرضة للإصابة بأمراض مختلفة.

الجزء الأول:

لإظهار تأثير الاضطرابات النفسية كالتوتر والخوف وهو ما يعرف بالإجهاد النفسي على كفاءة الجهاز المناعي نقدم الدراسات التالية:

- تم تقدير تركيز هرمونين وجد أن لهما علاقة بإنتاج و أداء بعض البروتينات المناعية هما هرمون الكورتيكوسเตرون، والكورتيزول المفرزين من طرف قشرة الغدة الكظرية لدى مجموعتين من الفئران ، إداهما في ظروف عادية و الأخرى عرضت لمسببات الإجهاد النفسي كالخوف، النتائج مماثلة في الشكل (أ) (من الوثيقة 1).
- عرضت مجموعتين من الفئران للإصابة بفيروس كورونا - CoV-SARS2- إداهما في ظروف عادية والأخرى عرضت لمسببات الإجهاد النفسي، وبعد 6 أيام تم تقدير كل من الشحنة الفيروسية وعدد الخلايا LT و LB على مستوى الطحال لدى المجموعتين، النتائج مماثلة في الشكل (ب) (من الوثيقة 1) .





- وضح العلاقة بين الإجهاد النفسي وكفاءة الجهاز المناعي، باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

لفهم كيفية تأثير الإجهاد النفسي على الجهاز المناعي بما يعرضه العضوية للإصابة بالأمراض، نقدم الدراسة التالية:

- تم متابعة نشاط إنزيم Caspase 3 المحفز للموت الخلوي المبرمج لدى الخلايا LT و LB على مستوى طحال مجموعة من الفئران حقن بtrakiz مختلفة من هرمون الكورتيكوستيرون ، النتائج مماثلة في الشكل (أ) (من الوثيقة 2).
- الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح آلية تأثير الكورتيزول على المستوى الجزيئي، مع نتائج متابعة تراكيز الأنترلوكينات المفرزة من طرف الخلايا المناعية في وجوده وفي غيابه.



- اشرح آلية تأثير الاجهاد النفسي على كفاءة الجهاز المناعي، باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2).



التمرين الثالث : (08 نقاط)

تؤمن بروتينات متخصصة على مستوى مختلفة من الخلايا العصبية نقل الرسائل العصبية فيما بينها والى الخلايا المنفذة كالعضلات عبر المشابك، غير ان عوامل داخلية قد تؤدي الى اختلالات في النشاط المرتبط بتلك البروتينات.

الجزء الأول: متلازمة الوهن العضلي الخلقي *La myopathie congénitale* هو اضطراب عصبي عضلي، موضعي او شامل تتمثل اعراضه في توقف وجيز (بسيط) في التنفس، وضعف في عضلات العين والفم والحلق...

يمثل الشكل أ من الوثيقة 1 التسجيلات الكهربائية المحصل عليها على مستوى عضلة بعد إحداث تنبهات متتالية (بوتيرة Hz 2) على مستوى العصب الذي يعصبها عند شخص سليم وشخص مصاب بمتلازمة الوهن العضلي الخلقي.

بينما الشكل ب من الوثيقة 1 يبرز مجموعة من البروتينات على مستوى المشبك العصبي العضلي (شخص سليم).



- صغ فرضية تبين فيها سبب الإصابة بمتلازمة الوهن العضلي باستغلالك لشكلين (أ و ب) من الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

لتحقق من صحة الفرضية المقترحة سابق و لمعرفة فعالية احدى الطرق المستعملة لتحسين الحالة الصحية للمصابين بمتلازمة الوهن العضلي نقترح عليك الدراسة التالية:

سمحت الملاحظات المجهرية عن طريق المجهر الإلكتروني وكذا تقنيات الوسم بالفلوره من قياس عدد الحويصلات المشبكية ومحتوها من المبلغ العصبي على مستوى الاتصالات العصبية العضلية لدى أفراد سليمة وأفراد تبدي أعراض متلازمة الوهن العضلي الخلقي، النتائج المحصل عليها موضحة في جدول الشكل أ من الوثيقة 2.


باستخدام تقنيات خاصة تمكن العلماء من تقييم نشاط إنزيم أستيل كولين ترانسفيراز لدى حيوانات سليمة وأخرى تبدي أعراض مشابهة لتلك الملاحظة لدى الأفراد المصابين بمتلازمة الوهن العضلي الخلقي.

النتائج المحصل عليها مبينة في الشكل ب من الوثيقة 2.


لمعرفة كيف يساهم دواء Pyridostigmine في تحسين الحالة الصحية للأشخاص المصابين بمتلازمة الوهن العضلي نجري التجارب التالية :

التجربة 1: نقوم بإحداث تنبيهات متكررة للوحة المحركة لثلاث مجموعات من الفئران ثم نسجل الاستجابة الكهربائية على مستوى اليف العضلي والنتائج مماثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (3).

التجربة 2: تم قياس النشاط إنزيمي لاستيل كولين إستراز على مستوى الشق المشبكي بعد حقن فئران سليمة بجرعة مقدارها 30mg / kg . و النتائج المتحصل عليها مماثل في الشكل (ب) من الوثيقة (3).



الشكل أ من الوثيقة 2	فرد سليم	فرد مصاب
عدد الحويصلات في وحدة المساحة (μm^2)	28	28
محتوى الحويصلات المشبكية	أستيل كولين بكميات ضعيفة جدا	أستيل كولين بكمية كبيرة



1- صادق على صحة الفرضية المقترنة سابقا باستغلالك معطيات الشكلين (أ و ب) للوثيقة (2).

2- بين كيف يساهم دواء Pyridostigmine في تحسين الحالة الصحية للأشخاص المصابين بمتلازمة الوهن العضلي باستغلالك الشكلي الوثيقة (3).

الجزء الثالث:

ووضح بمخطط الـ *النقل المشبكي* لدى شخص مصاب بمتلازمة الوهن العضلي مبرزا تأثير دواء Pyridostigmine.

ملاحظة: اقرأ بتمعن، ركز، حاول ثم أجب بدقة. "ليس عليك أن تكتب كل ما تعرف بل أن تعرف ما تكتب".

"**تمنياتنا بالتوفيق والنجاح**"

إنتهى الموضوع الثاني

العلامة	عناصر الإجابة على الموضوع الأول	
مجازأة	مجازأة	التمرين الأول (5 نقاط)
1.5	0.5 0.25 0.5 0.25	<p>1- الإجابة ب "صحيح" أو خطأ مع تصحيح الإجابات الخاطئة:</p> <p>أ- في غياب الضوء يكون انتقال الالكترونات غير ممكن بين جميع عناصر سلسة التركيب الضوئية خطأ.</p> <p><u>التصحيح:</u> في غياب الضوء يكون انتقال الالكترونات غير ممكن بين بعض عناصر سلسلة نقل الالكترونات وهي PSII و T2 () و T1 () .</p> <p>ب- يسمح الضوء بانتقال الالكترونات من الماء ذو كمون أكسدة وإرجاع مرتفع إلى (NADP+) ذو كمون أكسدة وإرجاع منخفض. صحيح</p> <p>ت- يستعمل الناقل (T1 + T2) الطاقة على شكل (ATP) الناتجة عن حركة الالكترونات لضخ البروتونات عكس تدرج في التركيز خطأ.</p> <p><u>التصحيح:</u> يستعمل الناقل (T2) الطاقة على شكل (ATP) والناتجة عن حركة الالكترونات بين جميع عناصر سلسلة نقل الالكترونات لضخ البروتونات.</p> <p>ث- يتطلب الفسفرة الضوئية على مستوى الكريمة المذنبة الطاقة صحيح</p>
2	0.5 0.75 0.75 0.75 3.5	<p>2 - النص العلمي:</p> <p>تميز النباتات اليخضورية باليات تحويل طاقية منها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات عضوية او ما يعرف بالتركيب الضوئي وفق مراحلتين متتاليتين كيميوضوئية و كيمويوبية لأن بعض المركبات الكيميائية المستعملة كمبידات الأعشاب الضارة توقف هذه العملية من أجل إيقاف نمو هذه الأعشاب الضارة كالمبيدين A و B. فكيف تتم الآلية المؤدية إلى تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية وكيف يؤثر المبيد A و B عليها؟</p> <p>تمت المرحلة كيميوضوئية على مستوى التيلوكوبت في وجود الضوء وفقاً للخطوات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - يمتص النظام الضوئي الفوتونات الضوئية بفضل الأصبغة الهوائية التي تنقل الطاقة دون انتقال الالكترونات عن طريق الرنين إلى زوج أصبغة مركز التفاعل للتهدیج و تتأكسد متخلية عن الكترونات محملة بالطاقة تنتقل عبر سلسلة من التوابل من ناقل ذو كمون أكسدة و ارجاع منخفض إلى ناقل ذو كمون أكسدة و ارجاع مرتفع. - يسترجع المركز التفاعلي للنظام الضوئي الثاني p680 الكتروناته و بالتالي قابلية التبيه من أكسدة الماء فتتحرر بروتونات في التجويف و ينطلق O2 و يعوض الكترونات الـ PSII اما الكترونات PSI فستقبل نهائياً من طرف + NADP الذي يرجع إلى NADPH.H+ وفق المعادلات التالية : $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$ $2\text{NADP}^+ + 2\text{H}^+ + 4\text{e}^- \longrightarrow 2\text{NADPH}$ <p>- يصاحب نقل الالكترونات على طول السلسلة التركيبية تراكم البروتونات الناتجة عن أكسدة الماء وتالكتالي يتم نقلها من الحشوة إلى التجويف عبر الناقل T2 مما يخلق تدرج في تركيز البروتونات بين الحشوة و التجويف فتنتشر البروتونات على شكل سيل يخرج عبر ال ATP ستقرار محفزاً إيه على فسفرة ال ADP إلى ATP في وجود ال Pi انها الفسفرة الضوئية وفق المعادلة الكيميائية التالية:</p> $\text{ADP} + \text{Pi} \xrightarrow{\text{طاقة}} \text{ATP}$ <p>- في وجود المبيد العضي A يرتبط هذا المركب بالناقل T2 و يتسبب في خفض كمون الأكسدة و الإرجاع الخاص به فلا تنتقل الالكترونات من الناقل الأول إلى هذا الناقل و تتوقف بذلك حركة الالكترونات على كامل السلسلة التركيبية الضوئية فلا تسترجع الالكترونات من التحلل الضوئي للماء و يتوقف اطلاق O2 و منه تفاعلات المرحلة الكيميوضوئية فلا يتشكل ال ATP و NADPH.H+ الضروريين لتفاعلات المرحلة الكيمويوبية فلا يتثبت CO2 و لا يتم تركيب المادة العضوية اللازمة لحياة الأعشاب الضارة ومنه موتها والتخلص منها.</p> <p>- تتم المرحلة الكيمويوبية على مستوى الحشوة وذلك بتوفر نواتج المرحلة الكيميوضوئية من ATP/ NADPH.</p> <p>- تتم عن طريق تشكيل مركبات وسطية ابتداء من تشكيل APG في وجود إنزيم RUBISCO عن طريق ثبيت ال CO2 ثم فسفرة ADPG إلى APG باماهة أحد نواتج المرحلة الكيميوضوئية ATP .</p> <p>ليتم بعدها ارجاع PGal عن طريق أكسدة أحد نواتج المرحلة الكيميوضوئية NADPH.H+ انطلاقاً من 2 جزيئه من PGal يتم تركيب المادة العضوية ثم تجديد Rudip و هذا باماهة ال ATP مرة أخرى حيث تتم هذه التفاعلات بشكل حلقي و الممثلة بحالة كالفن و ذلك وفقاً للمعادلة الكيميائية التالية:</p> $12\text{NADPH},\text{H}++ 18\text{ ATP} + 6\text{ CO}_2 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 12\text{ NADP}++ 18\text{ (ADP} + \text{Pi}) + 6\text{ H}_2\text{O}$ <p>- المبيد العضي B يثبط المرحلة الكيمويوبية عن طريق ثبيط نشاط إنزيم ال RuBiSCO فلا يتم ثبيت CO2 و ينتج عن ذلك عدم إنتاج المادة العضوية و عدم إنتاج متطلبات المرحلة الكيميوضوئية و بذلك تتوقف عملية التركيب الضوئي و تموت الأعشاب الضارة.</p> <p>يتم عند النباتات الخضراء تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية بفضل عملية التركيب الضوئي التي تتم على مستوى الصانعات الخضراء أين يتم الجمع بين تفاعلات مرحلة كيميوضوئية و تفاعلات مرحلة كيمويوبية و تستهدف بعض المواد مثل مبيادات أعشاب مرحلة معينة بهدف توقف عملية التركيب الضوئي عند النباتات الضارة و بالتالي القضاء عليها.</p>

التمرين الثاني (7 نقاط)

الجزء الأول:

1- تحليل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1).

استغلال الشكل أ : منحنيين بيانيين لتغيرات حجم الورم بدلالة الزمن:

في غياب الأوليغوميسين: زيادة كبيرة في حجم الورم تصل 450 ملم في اليوم 49

في وجود الأوليغوميسين: زيادة قليلة في حجم الورم تصل 100 ملم في اليوم 49

الإستنتاج: الأوليغوميسين يحد من نمو الورم السرطاني

2- تبرير استعمال الأوليغوميسين في معالجة الأورام السرطانية، باستغلالك لشكل (ب) من الوثيقة (1).

في غياب الأوليغوميسين أو وجوده بتركيز ضعيفة حتى 0.01: ثبات نسبة تركيب البروتين والـ ATP عند قيمة 100%.

في وجود الأوليغوميسين بتركيز كبيرة من 0.1 إلى 10: انخفاض نسبة تركيب البروتين والـ ATP لتصل إلى قيمة الدنيا 20%.

الإستنتاج: التراكيز المرتفعة من الأوليغوميسين تثبط تركيب البروتين عن طريق تثبيط تركيب ATP في الخلايا.

الربط (التركيز) :

يعمل المضاد الحيوي الأوليغوميسين على الحد من الأورام السرطانية نتيجة تثبيطه لتركيز الـ ATP من الطرف المتوكندي في الخلايا والضروري لتركيز البروتين مما يؤدي ذلك إلى توقف ظاهرة تركيب البروتين وبالتالي عدم تكاثر الخلايا السرطانية و تراجع الأورام.

الجزء الثاني :

شرح آلية تأثير الأوليغوميسين في معالجة الأورام السرطانية، باستغلالك لشكل (2) استغلال الشكل أ : جدول يوضح نتائج تجريبية أجريت على الغشاء الداخلي للميتوكندي في غياب الأوليغوميسين:

- PH الداخلي يساوي PH الخارجي = 7 (تساوي تركيز H) : عدم تركيب ATP وإنزيم ATP سنتاز غير نشط.

- PH الداخلي = 4 أقل من PH الخارجي = 8 (تركيز H الداخلي أكبر من تركيزه الخارجي) : تركيب عدد كبير من جزيئات ATP وبلغ نشاط إنزيم ATP سنتاز قيمة 100%.

في وجود الأوليغوميسين: PH الداخلي = 4 أقل من PH الخارجي = 8 (تركيز H الداخلي أكبر من تركيزه الخارجي) : تركيب عدد قليل من جزيئات ATP وبلغ نشاط إنزيم ATP سنتاز قيمة 10% فقط.

الإستنتاج: رغم تحقق شروط تدرج PH الوسط (تدرج تركيز H) إلا أن الأوليغوميسين يثبط تركيب ATP حيث أنه يثبط نشاط إنزيم ATP سنتاز.

استغلال الشكل ب: رسم تخطيطي يوضح تأثير الأوليغوميسين على المستوى الجزيئي

- يرتبط الأوليغوميسين بالجزء F0 من الكريمة المذنبة.

- يرتبط مع جذور الأحماض الأمينية.

- يمنع بذلك التدفق الخارجي للبروتونات وفق تدرج تركيزها.

الإستنتاج: يمنع الأوليغوميسين التدفق الخارجي للبروتونات بارتباطه بالجزء F0 من الكريمة المذنبة.

الربط:

- يرتبط الأوليغوميسين بالجزء F0 من الكريمة المذنبة مانعا التدفق الخارجي للبروتونات.

- غياب الطاقة الضرورية لنشاط إنزيم ATP سنتاز الموجود في الجزء F1 ومنه تثبيطه.

- عدم تركيب ATP الضروري لتركيز البروتين.

- تثبيط تركيب البروتين الضروري لنمو الورم السرطاني.

- الحد من نمو وتطور الورم.

التمرين الثالث (8 نقاط)

الجزء الأول:

إبراز المشكل العلمي اقتراح فرضية تفسيرية لحله باستغلال الوثيقة (01):

استغلال الشكل (أ) : يمثل منحنيين بيانيين لتغيرات كمية الـ CO_2 المدمجة في تركيزين مختلفين من الأكسجين بدلالة درجة حرارة الأوراق حيث نلاحظ:

كمية الـ CO_2 المدمجة تتزايد من 8(s)/μmol(s) عند درجة حرارة الأوراق تقدر ب 16 $^{\circ}C$ لتصل إلى قيمة تقدر ب 16

(μmol(s)/μmol(s)) عند درجة حرارة 17 $^{\circ}C$ وذلك في كلا التركيزين من الأكسجين (1% و 21%).

لكن عند التركيز 21% من الأكسجين تستمر تزايد كمية الـ CO_2 المدمجة تدريجيا إلى غاية 18(μmol(s)/μmol(s)) عند

درجة 22.5 $^{\circ}C$ ثم تنخفض قليلا كمية الـ CO_2 المدمجة إلى أن تصل إلى 16(μmol(s)/μmol(s)) عند درجة حرارة تفوق 30 $^{\circ}C$

بينما عند تركيز 1% من الأكسجين يستمر تزايد كمية الـ CO_2 المدمجة بشكل سريع إلى أن تصل إلى قيمة عظمى تقدر

ب 24(μmol(s)/μmol(s)) عند درجة حرارة 30 $^{\circ}C$ ثم تنخفض كمية الـ CO_2 المدمجة بعدها لتصل إلى

		30°C (μmol/s) حرارة تفوق . 21 حوالي
	0.25	الاستنتاج: التراكيز المرتفعة من الأكسجين تؤثر سلبا على كمية ال CO_2 المدمجة.
3.57	0.25	استغلال الشكل (ب): يمثل منحنى لتغيرات نشاط أنزيم ال بحالة درجة حرارة الأوراق حيث نلاحظ: - في درجات حرارة أقل أو تساوي 20°C : نسجل زيادة تدريجية في نشاط أنزيم ال Rubisco، حيث تصل إلى قيمة تقدر ب 2 $(\text{U}/\text{mg}/\text{protein})^{-1}$ عند درجة حرارة الأوراق 20°C . - في درجة حرارة أكبر من 20°C: نسجل استمرار تزايد نشاط أنزيم الribisco بشكل سريع بزيادة درجة حرارة الأوراق، لتصل قيمة أعظمية تقدر ب 8 $(\text{U}/\text{mg}/\text{protein})^{-1}$ درجة حرارة الأوراق 40°C .
	0.25	الاستنتاج: يستمر نشاط أنزيم الribisco في درجة الحرارة المرتفعة رغم انغلاق الثغور الورقية.
	0.25	استغلال الشكل (ج): يمثل منحنين لتغيرات تركيز ال APG بدلالة تركيز ال Rudip في حالة وجود ال CO_2 و في حالة وجود ال O_2 حيث نلاحظ: سواء في حالة وجود ال CO_2 و في حالة وجود ال O_2 : تركيز ال APG كناتج التفاعل (P) يتزايد بزيادة تركيز ال (مادة التفاعل) في الوسط، و تكون هذه الزيادة أكبر في وجود ال CO_2 و أقل في وجود الأكسجين.
	0.25	الاستنتاج: أنزيم الribisco يعمل في وجود الأكسجين و كذلك في وجود ال CO_2 على تحويل ال Rudip إلى APG (ناتج التفاعل P) إلى مادة التفاعل (S).
	0.5	من الأشكال (أ)، (ب) و (ج) نتوصل إلى أن: التراكيز المرتفعة للأكسجين تؤثر سلبا على عملية دمج ال CO_2 و رغم ذلك يستمر نشاط إنزيم ال Rubisco و الذي بإمكانه تحويل ال Rudip إلى APG سواء في وجود ال CO_2 أو في وجود ال O_2 . المشكل العلمي المطروح: كيف لأنزيم الribisco أن يعمل في وجود الأكسجين على تحويل ال Rudip إلى APG؟ اقتراح الفرضية التفسيرية: يعمل أنزيم الribisco في وجود الأكسجين على تحويل ال Rudip إلى APG، كون الموضع الفعال لأنزيم بإمكانه تثبيت الأكسجين و ينافس بذلك ال CO_2 على الموضع الفعال لأنزيم عند التراكيز المرتفعة منه (التراكيز المرتفعة من الأكسجين).
3	0.25	الجزء الثاني: بيان تأثير الأكسجين على إنزيم ال Rubisco مع إبراز الخاصية المميزة لأنزيم و المصادقة على الفرضية المقترحة استغلال الوثيقة (2): تمثل رسم تخطيطي يوضح عمل إنزيم الribisco في وجود ال O_2 و ال CO_2 حيث نلاحظ: في جود ال CO_2 و تركيز ال O_2 أقل من 21%: و بتدخل أنزيم الribisco يتثبت ال CO_2 على جزيئه خماسية ذرات الكربون (Rudip) ليحوله إلى جزيئين من مركب ثلاثي ذرات الكربون، يتمثل في جزيئين من ال APG و التي تتحول فيما بعد أ سكريات ثلاثية (Tp) يستخدم جزء منها في تجديد ال Rudip أثناء تفاعلات حلقة كالفن، و الجزء الآخر في تركيب السكريات السادسية الكربون (C_6). في جود ال CO_2 و تركيز ال O_2 أكبر أو يساوي 21%: ينافس ال O_2 ال CO_2 و يرتبط بأنزيم الribisco، حيث جزيئين من ال O_2 (2O ₂) يثبتها أنزيمين على جزيئين من ال Rudip و هو مركب خماسي ذرات الكربون و يحولها إلى جزيئين من ال APG (مركب ثلاثي ذرات الكربون) و التي تدخل في تفاعلات حلقة كالفن، و جزيئين من ال PG و هو مركب ثنائي ذرات الكربون، و التي تتحول فيما بعد إلى جزيئه ال Ser (مركب ثلاثي ذرات الكربون) و ال CO_2 ، إنه التنفس الضوئي.
	0.25	الاستنتاج: في التراكيز المرتفعة للأكسجين، يرتبط هذا الأخير بأنزيم الribisco بدلا من ال CO_2 و ينتج عن ذلك نصف كمية ال APG
	0.25	استغلال الوثيقة (3): تمثل نماذج مأخوذة عن برنامج راستوب لبنية الموضع التحفيزي لأنزيم الribisco في وجود ال O_2 و CO_2 حيث: يتكون الموضع التحفيزي لأنزيم Rubisco من عدد قليل من الأحماض الأمينية محددة و راثيا من حيث العدد (07)، من حيث النوع (Ser, Glu, Thr, Lys, His, His, Gln) و من حيث الترتيب (Ser387, Gln409, Thr182, Lys210, His302, Glu213)، تكون متباude في التسلسل الأولي و تقارب في الفراغ لتأخذ شكل فراغيا فريدا من نوعه يحدد وظيفة الأنزيم. و في وجود ال O_2 ترتبط جزيئه ال O_2 بالموضع التحفيزي لأنزيم الribisco و ذلك بتشكيل روابط انتقالية مع مجاميع كيميائية حرة لأحماض أمينية محددة و هي

		<p>رتبط جزيء CO_2 بنفس الموقع التحفيزي لأنزيم الريبيسكو تشكل روابط انتقالية مع مجاميع كيميائية حرة لجذور أحماض أمينية محددة وهي (Ser387, Glu213, Lys210, Thr182, Gln409) و في وجود شاردة المغذى يوم (Mg⁺)، حيث نلاحظ أنكل من O_2 وال CO_2 يشتراكان في القدرة على تشكيل روابط انتقالية مع نفس أربعة جذور أحماض أمينية من الموقع التحفيزي لأنزيم هي (Ser387, Gln409, Thr182, Lys210). كما أن بعض الأحماض الأمينية في الموقع التحفيزي تغير من أماكن جذورها بمسافات معينة حتى تتوارد في المكان المناسب لتشكيل روابط انتقالية مع المركبين O_2 و CO_2 ، إنه التكامل المحفز.</p> <p>الاستنتاج: ينافس الأكسجين CO_2 على الموقع الفعال لأنزيم الريبيسكو لقدرة كلا المركبين على تشكيل روابط انتقالية مع الموقع التحفيزي لأنزيم.</p> <p>و عليه من الشكلين (1) و (2) نتوصل إلى: في التراكيز العالية من الأكسجين، ينافس الأكسجين (مثبط تنافسي) لل CO_2 على التثبيت على الموقع التحفيزي لأنزيم الريبيسكو، وذلك لقدرة كلا المركبين (ال O_2 و ال CO_2) على الارتباط بنفس الموقع التحفيزي لهذا الأنزيم، مما يؤثر سلبا على عملية دمج CO_2 (كمية ال CO_2 المدمجة) و كذلك تسبب في استزاف مركب ال Rudip من الصانعة الخضراء، حيث يقوم الأنزيم في هذه الحالة بدمج ال O_2 مع جزيء ال Rudip و تحويله إلى جزيء من ال APG و جزيء ال PG ، حيث جزيئين من هذا الأخير تحول إلى ال Ser و ال CO_2 ، وهذا ما يسمى بالتنفس الضوئي.</p> <p>الخاصية المميزة للريبيسكو: هو امتلاكه لموقع فعال يرتبط و يتفاعل مع مركبين مختلفين هما الأكسجين و ال CO_2 ، لإنتاج نفس الناتج (APG) في تفاعل التنفس الضوئي (O_2) و كذا تفاعل تثبيت ال CO_2 (حفلة كالفن).</p> <p>و عليه فالفرضية المفترضة صحيحة، حيث يعمل أنزيم الريبيسكو في وجود الأكسجين على تحويل ال Rudip إلى APG لكون الموقع الفعال لأنزيم بإمكانه تثبيت الأكسجين، وبالتالي فهو ينافس (مثبط تنافسي) ال CO_2 على مكانه في التراكيز العالية من الأكسجين.</p> <p>2. الحل المقترن للتقليل من تأثير الأكسجين على عمل أنزيم الريبيسكو: تقادياً لتأثير التركيز العالية من الأكسجين على عمل الإنزيم بالتقليل من دمج ال CO_2 في المادة العضوية، المقترن للتقليل من درجة الحرارة المرتفعة عن طريق الزراعة المحمية حتى تبقى الشعور الورقية مفتوحة و منه تدفق ال CO_2 بشكل مستمر عبرها في وجود الضوء، ما يساهم في فعالية عملية التركيب الضوئي.</p>
1	0.25	<p>الجزء الثالث:</p> <p>الأنزيمات وسائل حيوية ضرورية لتحفيز التفاعلات البيولوجية للخلية، كونها من طبيعة بروتينية فهي ذات بنية فراغية خاصة تحافظ على استقرارها روابط كيميائية تنشأ بين المجاميع الكيميائية الحرجة لأحماض أمينية محددة حسب الرسالة الوراثية، كما يسمح بانطواء السلسلة البروتينية في الفراغ بتشكيل موقع خاص يسمى بالموقع الفعال و الذي يتكون من عدد قليل من الأحماض الأمينية بنوع و ترتيب محدد و بتوازن فراغي دقيق و منظم، حيث تكون متبااعدة في التسلسل الأولي و تقارب في الفراغ لتعطى شكلًا فراغيًا محدداً.</p> <p>و عليه فإن التخصص الوظيفي لأنزيم يرتكز على سلامة بنية الموقع الفعال الذي يتكون من منطقة التثبيت (تسمح بارتباط الركيزة بالأنزيم) و منطقة التحفيز تسمح بحدوث التفاعل، حيث و أثناء ارتباط الركيزة على الموقع الفعال لأنزيم بواسطة روابط انتقالية بين جزء من الركيزة و جذور الأحماض الأمينية الحرجة يتشكل المعقد (E-S).</p> <p>تكون هذه المجاميع متوازنة بطريقة مناسبة تسمح بالتكامل البيني الفراغي بين جزء من الركيزة و الموقع الفعال. يتطلب عمل الأنزيمات شروط ملائمة من درجة الحرارة و درجة الحموضة لتحافظ على بنيتها الفراغية و خصوصاً الموقع الفعال، حيث يؤدي الابتعاد عن القيم المثلثى لهذه العوامل إلى تغيير بنية الأنزيم و وبالتالي فقدان الوظيفة. تؤدي عدة عوامل على التخصص الوظيفي لأنزيم من بينها عوامل خارجية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - درجة الحرارة العالية و درجة الحموضة (PH) و اللذان يؤثران على الموقع الفعال فيفقد شكله المميز مما يعيق تثبيت الركيزة و عدم تشكيل المعقد (E-S) و وبالتالي عدم حدوث التفاعل الأنزيمي. - كما يتأثر بالتركيز المرتفع من الأكسجين في حالة أنزيم الريبيسكو، أين ينافس ال O_2 ال CO_2 على الموقع الفعال مانعاً بذلك دمج ال CO_2 و وبالتالي التقليل من كمية ال APG الناتجة و استزاف مركب ال Rudip من الصانعة الخضراء، مما يؤثر سلباً على فعالية عملية التركيب الضوئي (بخفض من نشاط التركيب الضوئي). <p>ملاحظة: بإمكان التلميذ التوسيع فيما يخص تأثير العوامل الخارجية من درجة الحرارة و PH.</p>

العلامة		عناصر الإجابة على الموضوع الثاني	
مجازة	مجازة	التمرين الأول (5 نقاط)	
<p>1. كتابة الصيغة الكيميائية للأحماض الأمينية لموقع التحفيز ضمن السلسلة الببتيدية :</p> <p>Handwritten chemical structures of Arginine and Lysine in their zwitterionic forms at pH 13 and pH 1 (acidic environment). The structures show the side chains (R groups) and the amino (NH₂) and carboxyl (COOH) groups. At pH 13, the side chains are deprotonated (Arg: R<sup>1</sup>NH<sub>2</sub>, Lys: R<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>). At pH 1, the side chains are protonated (Arg: R<sup>1</sup>NH<sub>3</sub>+, Lys: R<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>+).</p>			
1.5	0.5		
	0.25		
	0.5		
	0.25		
<p>2- النص العلمي:</p> <p>يرتكز التخصص الوظيفي للبوتينات على بنيتها الفراغية مثل إنزيم L-ASPARGINASE الذي يعمل على تحويل حمض الأسبارгин إلى حمض الأسبارتيك . الا ان نشاطه يتأثر بالتركيز العالية لمادة نتروجين الـ UreaNitrogen المحررة من خلايا الكبد ، فكيف تتسبب هذه المادة بالإصابة بسرطان ابيضاض الدم الحاد المتعلق بالنخاع الشوكي ؟</p> <p>يتوقف التخصص الوظيفي لإنزيم L-Asparginase على بنيته الفراغية و التي تحدد بعد ، نوع و ترتيب الأحماض الأمينية المكونة له و المحددة وراثيا و على الروابط الكيميائية التي تنشأ بين المجموعات الكيميائية لجزور الأحماض الأمينية (الكرياتية ، الشاردية ، الكارهة للماء ، الهdroجينية) المتوضعة في موقع صحيحة حسب المعلومة الوراثية.</p> <p>تسمح بنية الإنزيم بتجميع عدد قليل من الأحماض الأمينية المتواجدة في أماكن بعيدة في السلسلة الببتيدية في حيز صغير لتشكيل جزء مهم هو الموقع الفعال المكون من موقعين الأول موقع التثبيت (Ser-17 , Ala-90) و الثاني موقع للتحفيز (Lys-272 , Arg-156) .</p> <p>توقف وظيفة الإنزيم على تشكيل المعقد ES و ينشأ نتيجة تشكيل روابط انتقالية ضعيفة كالهيدروجينية بسبب التكامل البنائي بين جزء من الركيزة و الموقع الفعال وهذا ما يسمح بتحفيز تفاعل تحويل حمض الأسبارгин إلى حمض الأسبارتيك . الا ان نشاط إنزيم L-Asparginase يتأثر بالتركيز العالية لمادة نتروجين الـ UreaNitrogen المحررة من طرف خلايا الكبد كفضلات ناتجة عن هضم الأطعمة البروتينية ، حيث تعمل هذه المادة على تكسير الروابط الهdroجينية في مستويات مختلفة كال الموجودة على مستوى البنى الثانوية α و β بين المجاميع NH-CO او المتواجدة بين جذور الأحماض الأمينية او المساهمة في تشكيل المعقد ES مما يؤدي إلى تخریب البنية الفراغية و عدم حدوث التكامل البنائي بين الإنزيم و الركيزة و بالتالي عدم تحويل الأسبارгин إلى أسبارتيك و يؤدي تراكم الأسبارجين إلى تحفيز الخلايا السرطانية على صناعة مادتها الوراثية و زيادة معدل انقسامها و تكاثرها و ظهور مرض سرطان ابيضاض الدم .</p> <p>تعمل مادة نتروجين الـ UreaNitrogen السامة على تخریب بنية إنزيم L-Asparginase- بتكسيرها للروابط الهdroجينية التي تسهم مع باقي الروابط في استقرار بنية الفراغية فيتوقف نشاطه مما يؤدي إلى ظهور المرض</p>	<p>التمرين الثاني (7 نقاط)</p>		
<p>الجزء الأول:</p> <p>1- <u>توضیح العلاقة بين الاجهاد النفیی و کفاءة الجهاز المناعی:</u></p> <p>استغلال الشکل أ:</p> <p>يمثل الجدول الموضح بالشكل (أ) من الوثيقة (1) تركيز هرموني الكورتيکوستیرون و الكرتیزول المفرزین من طرف الغدة الكظریة لدى مجموعتين من الفئران احدهما عدیة والأخرى معرضة لمسببات الاجهاد النفیی حيث نلاحظ:</p> <p>عند المجموعة 1 (الشاهد): افراز هرموني الكورتيکوستیرون و الكرتیزول منخفض اد يفرز هرمون الكورتيکوستیرون بتركيز ng/ml 13 و الكرتیزول بتركيز ng/ml 20.</p> <p>اما لدى الفئران المعرضة للاجهاد النفیی: افراز هرمون الكورتيکوستیرون بتركيز مرتفع جدا مقدار $300 ng/ml$ و افراز هرمون الكرتیزول بتركيز مرتفع مقدار $35-40 ng/ml$.</p> <p>الاستنتاج: يؤثر الاجهاد النفیی سلبا على الغدة الكظریة و يتسبب في افراط افراز هرمون الكورتيکوستیرون و الكرتیزول.</p>			
0.25			
0.25			
0.5			

التمرين الثالث (8 نقاط)

الجزء الأول:

صغ فرضية تبين فيها سبب الإصابة بمتلازمة الوهن العضلي:

استغلال الشكل (أ) (من الوثيقة 1) :

على مستوى عضلة الشخص السليم: تسجيل تواتر كمونات عمل متقاربة ومتناوحة السعة.

على مستوى عضلة الشخص المصاب: تسجيل تواتر كمونات عمل متقاربة ومتناوحة السعة.

الاستنتاج: متلازمة الوهن العضلي الخلقي مرتبطة بتناقص سعة الاستجابة على مستوى العضلة. أو يعني الشخص المصاب بتناقص سعة الاستجابة العضلة للتنبيهات.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1:

تركيب الاستئيل كولين على مستوى العنصر قبل المشبكى بواسطة انزيم تركيب الاستئيل كولين انطلاقا من استئيل مرافق انزيم A و الكولين.

يتم تخزين الاستئيل كولين المركب في الحويصلات المشبكية.

تحرير الاستئيل كولين في الشق المشبكى عند وصول موجة زوال الاستقطاب الى نهاية الخلية قبل المشبكية.

يتوضع الاستئيل كولين على موقع تثبيت خاص به في المستقبلات الغشائية النوعية للوحدة بعد المشبكية.

يفقد الاستئيل كولين فعاليته نتيجة الاماهة الانزيمية (تفكيك الاستئيل كولين بفعل انزيم ستيل كولين استيراز الى حمض الخل (استيرات)+ كولين) .

يعاد امتصاص الكولين من قبل بروتين ناقل على مستوى الوحدة قبل المشبكية.

الاستنتاج: يساهم (يتدخل) مجموعة من البروتينات في نقل الرسالة العصبية على مستوى المشك العصبي العضلي .

الربط (التركيب): تومن مجموعة من البروتينات في نقل الرسالة العصبية على مستوى المشك العصبي العضلي الى الأعضاء المنفذة و حدوث اختلالات وظيفة قد تؤدي الى الإصابة بمرض الوهن العضلي نتيجة نقص في استجابة العضلة الى التنبيهات ، وهذا ما يسمح بطرح الفرضية التالية :

الفرضية : سبب الإصابة بمتلازمة الوهن العضلي راجع الى نقص في إنتاج الاستئيل كولين نتيجة حدوث خلل في احد البروتينات المسئولة عن تركيب الاستئيل كولين .

او حدوث خلل على مستوى احد البروتينات التي تضمن نقل الرسالة العصبية على مستوى المشك العصبي العضلي .

✓ ملاحظة: تقبل اي فرضية وجيهة

الجزء الثاني:

1- المصادقة على الفرضية :

استغلال الشكل الوثيقة 2:

عند الفرد السليم أو المريض بالوهن العضلي الخلقي فإن عدد الحويصلات في وحدة المساحة m^2 نفسه، عند القيمة 28.

بينما تكون الحويصلات عند الشخص السليم غنية بالاستئيل كولين وفقيرة جدا منه عند الأشخاص المصابين بالوهن العضلي الخلقي.

الاستنتاج: يوجد خلل في إنتاج المبلغ أستيل كولين عند الأشخاص المصابين بالوهن العضلي الخلقي

أو سبب الإصابة بمتلازمة الوهن العضلي راجع الى نقص في إنتاج الاستئيل كولين.

استغلال الشكل ب للوثيقة 2:

عند احيونات السليمية فإن نشاط إنزيم الكولين أستيل ترانسفيراز مرتفع إلى أكثر من 12 وحدة اعتبارية.

عند احيونات المصابة بالوهن العضلي الخلقي فإن نشاط إنزيم الكولين أستيل ترانسفيراز ضعيف جدا، يكاد يكون منعدما.

الاستنتاج: نقص في إنتاج الاستئيل كولين. راجع إلى نقص أو انعدام النشاط الإنزيمي لإنزيم أستيل كولين ترانسفيراز

الربط (التركيب):

سبب الإصابة بمتلازمة الوهن العضلي راجع إلى نقص في إنتاج الاستئيل كولين نتيجة ضعف النشاط الإنزيمي لإنزيم أستيل كولين ترانسفيراز المسؤول عن تركيب الاستئيل كولين مما يؤدي إلى نقص تخزينه في الحويصلات المشبكية .

و عند وصول الرسالة العصبية إلى النهاية العصبية يتم تحرير كمية قليلة من أستيل كولين غير كافية لنقل الرسالة العصبية إلى الأعضاء المنفذة ينتج عن ذلك نقص استجابتها مسببة اضطراب عصبي موضعي يتمثل اعراضه في ضعف العضلات

